



Secretariaat

☎ [03 285 20 00](tel:032852000)

✉ vincentius@zas.be

Bezoeken

Verpleegafdelingen: van 14 uur tot 20 uur

Materniteit: van 17 tot 19 uur (partner, broertjes & zusjes zijn doorlopend welkom)

Intensieve zorg: van 12.45 tot 13.15 uur en van 18.45 tot 19.15 uur

OVER

ZAS Vincentius

ZAS Vincentius is een algemeen ziekenhuis met 336 erkende bedden. Je kan hier terecht voor raadplegingen en ingrepen.

Campus Vincentius ligt het zwaartepunt van de thoraxheelkunde. Met de meest bevraagde MUG-dienst van Vlaanderen is ook de spoedafdeling op deze campus een vaste waarde in het Antwerpse centrum. Daarnaast is de materniteit d.m.v. het BFHI-label een referentie inzake natuurlijk bevallen en begeleiding bij borstvoeding. Verder is hier ook het muco-referentiecentrum gelokaliseerd.

Huisartsenwachtpost

Deze campus huisvest sinds juli 2021 **huisartsenwachtpost Brabo**. Daar kan je terecht tijdens het weekend of op feestdagen wanneer je een dringend medisch probleem hebt dat niet kan wachten tot je eigen huisarts weer beschikbaar is. De huisartsenwachtpost Brabo is een samenwerking tussen GZA Ziekenhuizen en huisartsenkring Minerva (Antwerpen-centrum en Berchem). Contactgegevens, openingsuren en andere informatie vind je op [de website van de huisartsenkring](#).

Maatschappelijke zetel:

ZAS vzw
Kempstraat 100
2030 Antwerpen

Ziekenhuis aan de Stroom (ZAS) vzw is de fusie van ZNA en GZA Ziekenhuizen.

Dit is een rookvrije site

ZAS Vincentius is volledig rookvrij. Ook **het plein voor het ziekenhuis** en het terrein rond de gebouwen zijn rookvrij. Als roker kan je terecht in de rookhut links op het voorplein, of in de rookhut op **route 121**.

Bereikbaarheid

Met de auto

Het adres van ZAS Vincentius is Sint-Vincentiusstraat 20 , 2018 Antwerpen.

[Bekijk de routebeschrijving op Google Maps.](#)

Sinds 1 augustus 2023 geldt een nieuw parkeerreglement in een deel van het centrum van Antwerpen. Deze campus ligt niet in dat beperkte parkeergebied. Je mag parkeren in de straten rond het ziekenhuis. [Je leest meer hierover bij de stad Antwerpen.](#)

Opgelet: er zijn [wegenwerken op de Grotesteenweg](#) vanaf de Uitbreidingsstraat tot en met het kruispunt met de Elisabethlaan en het Ringfietspad. Hou daarom rekening met omleidingen om op tijd bij campus Vincentius aan te komen, als je vanaf Berchem of Mortsel komt. Volgens de huidige planning duren de werken tot september 2024.

Lage-emissiezone (LEZ)

Deze campus bevindt zich in een LEZ-zone.

Is jouw voertuig toegelaten? Wat kan je doen als je voertuig niet toegelaten is? Lees er alles over op [de website van Slim naar Antwerpen.](#)

Met de fiets

Er is een fietsenstalling aan de hoofdingang.


Je kan hier ook gebruik maken van Velostation 93.

Met het openbaar vervoer

ZAS Vincentius bevindt zich in het centrum van Antwerpen, vlakbij het Stadspark, de Belgiëlei en de Mechelsesteenweg. Deze campus is ook vlot bereikbaar met het openbaar vervoer, zelfs vanaf Linkeroever. De dichtstbijzijnde haltes zijn "Antwerpen Belgiëlei", "Antwerpen Sint-Vincentius" en "Antwerpen Gounod". Meer informatie vind je op de website van De Lijn.

- **Gebruik Google Maps.**

Vul je locactie in, klik op het icoontje voor openbaar vervoer en je krijgt een overzicht van hoe je het best met het openbaar vervoer naar het ziekenhuis komt.



- **Gebruik de routeplanner van De Lijn**
- **Plan je treinreis op de website van NMBS**

Bereken je route

✕ 📍

Wandelafstand ▼ 5 min ▼

📍 Geef me reisadvies

Filters en lagen ✕



Standaard



Wandelen



Fiets



Openbaar vervoer



Deel-mobiliteit



Auto



P+R



Toegankelijkheid

Voor:

Digipunt

Elke donderdag van 13.30 tot 16.30 uur kan je met vragen over online toepassingen terecht bij het digipunt in de inkomhal. Denk aan vragen over 'Itsme' of over Mijn ZAS.

Wil je op een ander moment of een andere plaats naar een digipunt of webpunt? Bel naar [03 286 85 85](tel:032868585) voor meer informatie.

Horeca

	Wat?	Waar?	Openingsuren
Bezoekerscafetaria	Warme en koude dranken, gebak en warme gerechten	Op het gelijkvloers. Wandel aan de ingang naar rechts en neem vervolgens de eerste gang links.	Maandag tot vrijdag 10 uur - 17 uur Weekend en feestdagen gesloten

Zijn de cafetaria en de shop gesloten? In onze campus vind je op verschillende plaatsen automaten met koude en warme dranken. Daar kan je dag en nacht terecht voor een verfrissing.

Winkel

	Wat?	Waar?	Openingsuren
Shop Sint-Vincentius	Snacks, dranken, kranten, tijdschriften en kleine geschenken	Op het gelijkvloers, links van de ingang	Maandag tot vrijdag 9 uur tot 17 uur Weekend en feestdagen 14 uur - 18 uur

Wifi/telefoon/televisie

Bezoekers en patiënten hebben toegang tot gratis draadloos internet via het netwerk  **ZAS-open**. Je hebt geen paswoord nodig en hoeft je niet te registreren.

Wil je graag iemand bellen tijdens je verblijf en heb je geen gsm? Onze kamers beschikken over telefoontoestellen. Vraag vooraf om een telefooncode bij de opnamedienst. De huur van deze toestellen is gratis, je betaalt enkel voor de uitgaande gesprekken.

Kapel

Wil je even rust opzoeken? Bezoekers en patiënten zijn in ZAS Vincentius steeds welkom in de kapel voor een moment van bezinning of gewoon om even op adem te komen.

De kapel bevindt zich op het gelijkvloers, recht voor de hoofdingang. Je kan er terecht op weekdays van 8 uur tot 20 uur. Op hoogdagen wordt er een misviering opgedragen.

Voor patiënten

Kapper en pedicure

Nood aan een moment zelfzorg? In ZAS Vincentius kan je tijdens je verblijf je haar laten knippen of een ontspannende voetverzorging krijgen.

De kapper in ZAS Vincentius knipt steeds op maandag, dinsdag en donderdag en komt tot bij jou op de kamer.

Een afspraak maken voor de kapper of pedicure doe je via de verpleging op de afdeling. Je betaalt via de ziekenhuisfactuur.

Kluisjes

In ZAS Vincentius hebben alle kamers een kluis. Daarin kan je jouw persoonlijke spullen veilig achterlaten.

Diensten

 Filter deze pagina

1 - 9 van 56



Dienst

Algemene heelkunde

chirurgie, operatieve geneeskunde



Dienst

Anesthesie

Verdoving, pijnstilling



Dienst



Dienst

Cardiologie voor kinderen

hartziekte



Dienst

Endocrinologie

hormoonziekte, suikerziekte, diabetes, obesitas, bijnier, hormonen, schildklier, hypofyse, calciumproblemen

Diëtisten

voedingsadvies, voedingsconsultatie



Dienst

Endocrinologie voor kinderen

kinderhormoonziekten, kinderen met hormoonproblemen



Expertisecentrum

Expertisecentrum voor complexe pancreaschirurgie



Dienst

Fysische geneeskunde en revalidatie



Dienst

Gastro-enterologie

maag-, darm- en leverziekten

Onderzoeken

[Filter deze pagina](#)

1 - 132 van 132



onderzoek hormonale stoornissen

Via bloed- en urineonderzoek wordt gekeken of er stoornissen zijn in je hormonenstofwisseling, zoals bijvoorbeeld afwijkingen in de (bij)schildklier, hypofyse of bijnier.



24 uurs-EEG

24 uurs-elektro-encefalogram

Deze test meet 24 uur lang de hersenactiviteit om problemen op te sporen die we in korte tests niet altijd vinden. We kijken hoe de hersenen werken, ook tijdens de slaap.



24-uurs urinecollectie

Om in te schatten hoeveel de nieren nu precies van een bepaalde stof uitscheiden, kan het zinvol zijn om de urine van een volledige dag en nacht op te sparen en te onderzoeken.



6 minutenwandelttest

zesminutenwandelttest, 6MWT

Bij deze test meten we welke afstand je kan afleggen binnen 6 minuten. Tijdens de test meten we je zuurstofsaturatie (zuurstofgehalte in het bloed) en je hartslag.



Allergietest

huidallergologisch onderzoek, huidpriktest

Bij een allergietest gaan we na of je lichaam antistoffen heeft aangemaakt tegen



Angiografie

röntgenonderzoek bloedvaten, contrastonderzoek bloedvaten, bloedvatenonderzoek

bepaalde stoffen of allergenen.



Arteriële katheter

Een arteriële katheter is een kunststof buisje dat direct in een slagader wordt geplaatst.

Bij een angiografie maakt de radioloog de bloedvaten zichtbaar door er rechtstreeks een contrastvloeistof in te spuiten en daarbij snel een aantal röntgenfoto's te maken.



Artrografie

Artrografie is een onderzoek waarbij we contrastvloeistof in een gewricht injecteren en er daarna röntgenbeelden van maken.



BAEP-onderzoek

brainstem auditory evoked potential (BAEP)

BAEP kijkt hoe je hersenen reageren op geluiden. De test helpt om gehoor- en zenuwproblemen in de hersenstam te ontdekken.



Beeldvorming bij (vermoeden van) kanker

Bij de diagnose en ook tijdens de behandeling en opvolging van vaste tumoren zijn meestal regelmatige beeldvormingsonderzoeken aangewezen.



BERA-onderzoek

brainstem evoked response audiometrie, auditory brainstem response (ABR)

Met deze objectieve gehoortest meten we het gehoor tot op het niveau van de hersenstam (hersenstamaudiometrie).



Biopsie arteria temporalis

Bij een temporalis biopsie halen we onder lokale verdoving een klein stukje van 2 tot 4 cm weg uit een bloedvat bij de slaap.



Blaasfunctieonderzoek

blaasonderzoek, urodynamisch onderzoek (UDO)

De uroloog onderzoekt de werking van de blaas, sluitspier en het plasmechanisme. Om de blaasdruk te meten wordt de blaas via een buisje langs de plasbuis gevuld.



Bloedafname

Voor een bijkomend bloedonderzoek neemt de zorgverlener bloed af. Je bloed wordt in het labo geanalyseerd.



Bloedgasbepaling

We nemen een bloedstaal uit de slagader in je pols om het zuurstof- en koolzuurgehalte in je bloed te meten. Zo komen we te weten hoe goed je longen functioneren.



Bloedonderzoek

Via bloedonderzoeken schatten we de nierfunctie in, kijken we de zoutbalansen na en sporen we risicofactoren op hart- en vaatlijden zoals diabetes en cholesterolverhoging op.



Bloedonderzoek bij IBD

In je bloed kunnen we zien of je een ontsteking, bloedarmoede of een vitaminedeficiëntie hebt.



Bloedonderzoek bij reuma

In dit onderzoek bekijken we de waarden van de verschillende stoffen in het bloed. Abnormaal hoge of lage waarden of specifieke biomarkers kunnen wijzen op bepaalde aandoeningen.



Bloedonderzoek bij vaste tumoren

Bij de diagnose, tijdens en na de behandeling van kanker gebeurt regelmatig een bloedonderzoek. Dat is nodig om de impact van de ziekte en therapie op het lichaam na te gaan.



Bloedonderzoek om mucoviscidose op te volgen

Met een bloedonderzoek kunnen we bij mucopatiënten de werking van de nieren, lever en alvleesklier nagaan en de hoeveelheid vitamines meten.



Borstbiopsie

tru-cut biopsie, invasief weefselonderzoek

Bij een borstbiopsie verwijdert de arts wat weefsel van de borstklier. Dat weefsel wordt daarna onder de microscoop onderzocht om te zien of er kwaadaardige cellen aanwezig zijn.



Borstonderzoek

Bij een algemeen borstonderzoek controleert de arts je borsten en okselholtes door te kijken en te voelen. Als het nodig is, kan er ook een mammografie uitgevoerd worden.



Botmeting

botdichtheidsmeting, botdensitometrie (BMD), bone mineral content (BMC), Dual-energy X-ray Absorptiometry (DXA of DEXA), DXA-scan, DEXA-scan

Bij een botmeting gaan we aan de hand van röntgenstralen het kalkgehalte in het bot na.



Capillaroscopie

nagelriemonderzoek

Bij een nagelriemonderzoek brengen we de kleine bloedvaatjes (capillairen) van de nagelriem in beeld.



Centraal veneuze katheter

Een centraal veneuze katheter is een kunststof buisje dat de arts in een grote ader plaatst.



Cone beam CT-scan

Een cone beam CT is vergelijkbaar met een CT-scan, maar kan met minder straling 3D-beelden maken van de aangezichtsschedel.



Botscan

skeletscintigrafie

Een onderzoek van je skelet, zijnde je botten en gewrichten. Deze scan brengt aandoeningen en de doorbloeding van (bepaalde delen van) je skelet in beeld.



Capsuleonderzoek van de dunne darm

Bij dit onderzoek slik je een minuscule camera in. Daarmee kunnen we de binnenkant van je darmen filmen en zo afwijkingen opsporen. In de praktijk is dit onderzoek zelden nodig.



Colonoscopie

coloscopie, endoscopisch onderzoek van de dikke darm, darmonderzoek

Een colonoscopie is een onderzoek van de dikke darm. Hiervoor gebruiken we een endoscoop: een buisje met op het einde een kleine camera. Die brengen we voorzichtig in via de anus.



Continue nierdialyse

Sommige patiënten worden dag en nacht gedialyseerd. Vooral instabiele patiënten met een erg lage bloeddruk en patiënten met ernstige infecties.



Coronarografie

röntgenonderzoek kransslagaders

De arts brengt via je pols of lies een katheter in en schuift het naar je hart. Via de katheter spuit hij contraststof en röntgenstralen in die de kransslagaders in beeld brengen.



Dermoscopie

Bij dermoscopie bekijken we een moedervlek via een loep of scan. Zo weten we of deze goed- of kwaadaardig is.



Diagnostische laparoscopie

kijkonderzoek buikholte

Een diagnostische laparoscopie is een kijkonderzoek van de buikholte. De arts brengt een kleine camera in om je buikholte of organen te bekijken.



Duplex arteria temporalis

Bij dit onderzoek maken we gebruik van 2 technieken die werken met geluidsgolven: echografie en doppler. We kijken naar de slagader aan de zijkant van het hoofd bij de slaap.



CT-scan

computertomografie

Een CT-scanner maakt met röntgenstralen dwarsdoorsneden van je lichaam. Om het contrast tussen de verschillende weefsels te vergroten, krijg je vaak een contrastmiddel



Diagnostische hysteroscopie

Kijkonderzoek baarmoeder

Bij een diagnostische hysteroscopie kijken we in de baarmoeder met een kleine camera die we inbrengen via de vagina. Zo kan de arts afwijkingen in de baarmoeder opsporen.



Doppleronderzoek

dopplertechniek, kleurendoppler, kleurendoppler-echografie

Met de dopplertechniek worden naast de grijswaarden van het echografisch onderzoek ook kleuren afgebeeld en hoorbare geluiden geproduceerd.



Duplex halsvaten

Duplex halsvaten is een echografisch onderzoek om te meten hoe het bloed in je hals stroomt. Zo kunnen we vernauwingen of verstoppingen ter hoogte van de halsvaten opsporen.



Echo-endoscopie



Duplexonderzoek craniale bloedvaten

Bij dit onderzoek worden de bloedvaten van je hoofd en rond je oksel onderzocht bij



Echografie

Ultrasoundonderzoek

Een echografie maakt gebruik van geluidsgolven met een hoge frequentie om organen, spieren en andere structuren in beeld te brengen. Het onderzoek is pijnloos en onschadelijk.



Echografie van de nieren

Met een echografie brengen we de nieren in beeld en zoeken we naar afwijkingen van vorm of uitzicht van de nieren. Zijn ze kleiner geworden (schrompelnieren)? Zijn er niercysten?



Electromyografie (EMG)

elektrisch spier- en zenuwonderzoek, elektromyografisch onderzoek, zenuwgeleidingsonderzoek

Met een elektromyografie of EMG testen we of je spieren en zenuwen goed werken en prikkels wel aan elkaar doorgeven zoals het hoort.



Elektrocardiogram

ECG, EKG, hartfilmpje

Hiervoor brengen we via je mond of anus een buisje in, met op het uiteinde een echoapparaat. Daarmee bekijken we je spijsverteringskanaal. Soms nemen we weefsel af voor onderzoek.



Echografie borstkas

echografie thorax

Met dit onderzoek kan je longarts met onhoorbare (ultrasone) geluidsgolven afwijkingen opsporen in je borstkas zoals vochtophopingen.



EEG

elektro-encefalogram

EEG meet de elektrische activiteit in je hersenen om te controleren of ze goed werken.



Elektro-encefalogram

Een EEG (elektro-encefalogram) maakt een opname van de elektrische activiteit van de hersenen in verschillende delen van het hoofd.

De cardioloog registreert de elektrische activiteit van je hart en krijgt daardoor meer informatie over de hartfrequentie en de (on)regelmatigheid van het hartritme.



Endocriene functietesten

We kijken of de endocriene klieren goed functioneren, bv. schildklier of bijnier. We dienen jou een stof toe en kijken hoe je daarop reageert door bloed-, urine- en/of zweettesten.



Enteroscopie

Bij een enteroscopie onderzoeken we de dunne darm met een endoscoop. Dat is een buisje dat we inbrengen via de mond of anus. Soms nemen we stukjes van de wand voor onderzoek.



ERCP

Endoscopische Retrograde Cholangio Pancreaticografie

Met een ERCP brengen we een contrastvloeistof aan in je galwegen. Zo kunnen we duidelijke foto's maken van je galwegen en pancreas en problemen vaststellen of behandelen.



Endobronchiale echografie met punctie

EBUS-TBNA, echo-endoscopie via luchtweg met punctie, EndoBronchial Ultra Sound (EBUS) transbronchial needle aspiration (TBNA)

Bij dit onderzoek kan je longarts door de 'v' van je luchtpijp 'kijken'. Indien nodig



Endotracheale tube

De endotracheale tube wordt via mond (of neus) in de luchtpijp gebracht om de beademing patiënt te kunnen beademen via de beademingsmachine.



Epidurale pijnstilling

Bij epidurale of peridurale analgesie of pijnstilling (ruggenprik) dient de anesthesist pijnverdovende medicatie toe via een klein buisje (katheter) in de rug.



Erfelijkheidsonderzoek bij kanker

genetisch onderzoek bij kanker, DNA-onderzoek bij kanker

Genetisch onderzoek kan aantonen of het voorkomen van kanker in jouw familie al dan niet erfelijk bepaald is. Bij 5 tot 10 % van alle mensen met kanker is dat het geval.



Evenwichtsonderzoek

vestibulair onderzoek, videonystagmografie (VNG)

Door je oogbewegingen te registreren, controleren we de goede werking van de evenwichtsorgaanjes in je binnenoor en geven we de werking van je



Gangonderzoek bij ouderen

Om ongevallen te voorkomen, kan je via het geriatrisch dagziekenhuis je mobiliteit, gangstoornissen en/of herhaaldelijk vallen in kaart laten brengen.



Gehoortest

audiologische test, audiometrie

Hiermee bepalen we hoe goed je geluiden kan horen. Dat gebeurt op basis van de luidheid (intensiteit) en de snelheid van de geluidsgolftrillingen (toonhoogte).



Gezichtsveldonderzoek

automatische perimetrie (AP), Goldmann gezichtsveldonderzoek

Bij een gezichtsveldonderzoek gaan we na hoe gevoelig de lichtwaarneming is in het hele gezichtsveld van je oog, dus niet alleen centraal.



Hyperventilatie test



Fietstest

ergospirometrie, fietsproef, inspanningsproef

Met dit inspanningsonderzoek op een fiets meten we je conditie en je mogelijkheid tot inspanningen aan de hand van je ademhaling en bloedwaarden.



Gastroscopie

Bij een gastroscopie onderzoekt de arts de slokdarm, maag en twaalfvingerige darm met een endoscoop. Dat is een soepel buisje dat via de mond wordt ingebracht.



Geriatrische evaluatie

geriatrisch assessment, multidisciplinair complex geriatric advies, multidisciplinair complex geriatric advies, Comprehensive Geriatric Assessment (CGA)

Met een geriatrisch assessment kunnen we de vaardigheid van ouderen evalueren op lichamelijk, psychisch, functioneel en sociaal vlak.



Hoornvliesscan

corneatopografie

Met een corneatopografie meet je oogarts nauwkeurig de vorm, de bolling en het oppervlak van je hoornvlies (cornea).



Internistisch onderzoek

De longarts vraagt je om in een sneller tempo te ademen om het koolzuur in de uitgeademde lucht te kunnen meten. De test dient om de diagnose van hyperventilatie te kunnen stellen.

Bij dit onderzoek bekijken we het lichaam in zijn geheel en niet een specifiek onderdeel. Hierbij maken we soms ook gebruik van bloed-, urine- of andere onderzoeken.



Intracraniële katheter

Een intracraniële katheter wordt in het operatiekwartier geplaatst door de neurochirurg tussen de twee hersenhelften.



Inwendig gynaecologisch onderzoek

Een inwendig gynaecologisch onderzoek is een routineonderzoek waarbij de gynaecoloog voorzichtig de vagina, baarmoeder, baarmoeder en andere organen onderzoekt.



Jaaronderzoeken diabetes

Jaaronderzoeken zoals oogfundus-, urineonderzoek en EKG helpen om problemen vroeg te ontdekken, zodat we op tijd kunnen ingrijpen.



Kijkonderzoek longen

endoscopie longen, endoscopie luchtwegen, bronchoscopie

Bij een bronchoscopie kijkt je longarts met een dunne flexibele slang met daarop een lens of een kleine videocamera in je luchtwegen.



Kijkonderzoek plasbuis en blaas

cystoscopie, cystoscopisch onderzoek

Bij een cystoscopie kijkt de uroloog via een smal buisje met een camera (cystoscoop) in de plasbuis en blaas. Dat gebeurt onder lokale verdoving.



Kijkoperatie achter borstbeen/in borstholte

mediastinoscopie

Deze ingreep helpt bij het stellen van de juiste diagnose. Via een insnede boven het borstbeen nemen artsen stukjes weefsel om te onderzoeken.



Kleurenechografie



Kijkoperatie longvliezen

endoscopie longvliezen, pleuroscopie

Bij een pleuroscopie kijkt je arts met een kleine camera of pleuroscop naar je

longvliezen (pleurabladen). Je bent hierbij



Kleurstoffoto van het netvlies

fluorescentie angiografie (FAG), fluo-angiografie, fluo

Door een contrastvloeistof in een ader in te spuiten, lichten de bloedvaten in het netvlies op en worden kleine afwijkingen veel duidelijker. Een camera legt de beelden vast.



Klinisch onderzoek reumatologie

Bij dit onderzoek onderzoeken we je van kop tot teen waarbij het bewegingsstelsel meestal centraal staat. Soms komen er bijkomende evaluaties van het hart, de longen, enz. bij.



Leverbiopsie

leverpunctiebiopsie

Bij een leverbiopsie neemt de arts een klein stukje weefsel van de lever weg. Dat stukje weefsel noemen we een biopt. Het biopt onderzoeken we daarna onder de microscoop.



Longpunctie

punctie longen, CT/echo-geleide punctie longen, transthoracale punctie, TTP

Een kleurechografie brengt via een probe op de borstkas of slokdarmsonde de structuur en bloedstroom binnen het hart gedetailleerd in beeld.



Klinisch onderzoek orthopedie

Bij een klinisch onderzoek heb je een grondig gesprek met de arts en onderzoekt die je steun- en bewegingsstelsel om te kijken of alles nog goed werkt.



Lactose-intolerantietest

lactose-blaastest, waterstof-ademtest

Met een lactose-tolerantietest testen we of je lichaam melkproducten van dieren goed kan verteren. Je drinkt een vloeistof met lactose. Daarna testen we je elk half uur je adem.



Longfunctieonderzoek

longfunctietest

Dit onderzoek geeft informatie over de werking van je longen. We meten onder andere de inhoud van je longen en de zuurstofopnamecapaciteit.



Longvliespunctie

punctie longvliezen, pleurapunctie, paracentesis

Onder begeleiding van een scanner of echo neemt de arts met een dunne holle naald een klein stukje verdachte longweefsel weg voor onderzoek in het labo.

Met een dunne holle naald neemt de arts het vocht tussen je longvliezen weg en laat dat onderzoeken in het labo.



Mammografie

röntgenfoto borsten

Een mammografie brengt met röntgenstralen het borstweefsel in beeld. Het onderzoek dient om borstletsels op te sporen en op te volgen. Het duurt ongeveer een kwartier.



Medische beeldvorming

Om een beeld van je lichaam te krijgen, kan de spoedarts een RX, CT-scan, echografie of NMR uitvoeren. Die beelden zijn heel belangrijk om eventuele afwijkingen te ontdekken.



MEP

motor evoked potential

MEP kijkt hoe je spieren reageren wanneer de hersenen magnetisch worden gestimuleerd. Zo kunnen we zien hoe goed je zenuwen en spieren werken.



Microscopisch onderzoek bij schimmelinfecties en vermoeden van schurft

Als we vermoeden hebben van schimmelinfectie of schurft, nemen we een staaltje van de huid. Dit onderzoeken we microscopisch.



Microscopisch oonderzoek

micro-otoscopie

Bij dit onderzoek kijken we met een microscoop naar de gehoorgang, het trommelvlies en eventueel het middenoor.



MRI

magnetic resonance imaging, magnetische resonantie (MR), MR-onderzoek, nucleaire magnetische resonantie (NMR), kernspintomografie (KST), kernspinresonantie

Een MRI maakt met een sterke magneet in elke gewenste richting doorsneefoto's van je lichaam. Het onderzoek duurt meestal ongeveer 20 minuten.



MRI van de dunne darm

enterografie



Muscoskeletale echografie

MSK-echografie

Bij een enterografie maken we met een MRI-toestel via radiogolven foto's van je dunne darm. Hiervoor ga je op een tafel liggen die een tunnel wordt geschoven.

Bij dit onderzoek stuurt een toestelletje geluidgolven door je lichaam. Die weerkaatsen op je spieren, gewrichten, pezen, botten en ligamenten, waardoor we ze zien op een scherm.



Netvliesfoto

fundusfoto

Met een netvliesfoto kan de oogarts de bloedvaatjes van je netvlies beoordelen en eventuele afwijkingen in een vroeg stadium ontdekken.



Netvliesscan

optical coherence tomography (OCT), OCT-scan

Met een OCT-scan maken we beelden in hoge resolutie van onderdelen van je oog. Die beelden geven een doorsnede van bijv. het netvlies of de oogzenuw.



Neusdoorgankelijkheidstest

rhinomanometrie

Bij een rhinomanometrie meten we hoeveel lucht er door je neus gaat als je in- en uitademt. Zo achterhalen we de weerstand en in welke mate er sprake is van een verstopping.



Neusonderzoek

neusendoscopie, endoscopie neus, nasale endoscopie, nasofaryngoscopie, kijkonderzoek neus

Bij een neusendoscopie schuift de NKO-arts via een neusgat een flexibel of star buisje met daarop een camera (endoscoop) in je neus om de binnenkant van je neus te bestuderen.



Neuspotentiaal meting

NPD-meting

Zout bestaat uit de stoffen natrium en chloor. De arts kan die meten in de neus om te onderzoeken hoe in het lichaam zout van de ene cel naar de andere gaat.



Nierbiopsie

nierweefselonderzoek

Bij een nierbiopsie nemen we onder plaatselijke verdoving een klein stukje nierweefsel weg voor onderzoek onder de microscoop.



NMR

Nucleaire Magnetische Resonantie

Een NMR-scan maakt gedetailleerde beelden van binnen in het lichaam. NMR werkt met



Onderzoek door de spoedarts

De spoedarts bekijkt je klachten zorgvuldig en voert tests uit om te bepalen wat er aan de hand is. Is er dringend bijkomend onderzoek nodig? Dan plant de spoedarts dat in.



Onderzoek van urine

Afwijkingen in de urine, zoals de aanwezigheid van eiwit of bloed, kunnen wijzen op een ziekte van de nieren.



Oogdrukmeting

tonometrie

Elk oog heeft een bepaalde spanning. Je oogarts meet je oogdruk met een applanatie-tonometer of met een 'luchtpuf' (luchttonometrie of pneumotonometrie).



Orthopantomogram (OPG)



NO-meting

FeNO-onderzoek

Met dit onderzoek meten we de hoeveelheid stikstof in de lucht die je uitademt. Zo kunnen



Onderzoek van je stoelgang

Zijn je darmen ontstoken? Dan vinden we een bepaald eiwit in je stoelgang: calprotectine. Je stoelgang kan ook aantonen of je last hebt van een virus, bacterie of parasiet



Oogbiometrie

oculaire biometrie, lensmeting

Bij een oogbiometrie nemen we de 'maten' van je oog: de kromming van het hoornvlies, de diepte van de voorste oogkamer, de lengte van het oog ...



Oogonderzoek bij kinderen

We bekijken de oogstand, oogbewegingen en samenwerking tussen de ogen. We meten ook de oogsterkte en het zicht en onderzoeken het hoornvlies, de lens, de oogzenuw en het netvlies.



Percutane tracheotomie

De percutane tracheotomie is voor patiënten die langdurige beademing nodig hebben.

Dit is een röntgenfoto van de volledige kaak

(ook de kaakgewrichten) die ook alle



Perifere katheter

Een perifere katheter zorgt ervoor dat vocht en medicijnen rechtstreeks via de bloedbaan worden toegediend.



Picco- of SwanGanzKatheter

Deze speciale katheters worden in een centrale ader of slagader geplaatst. Met deze katheters kunnen we het hartdebiet en de vullingstoestand opvolgen.



Pijndiagnose

pijndiagnostiek

Als je pijn signaleert, gaat je arts op zoek naar de oorzaak om die indien mogelijk weg te nemen en je pijn te verlichten.



Pijnmeting

NRS-score

Bij een pijnmeting vraagt de zorgverlener om je pijn uit te drukken in een cijfer tussen 0 (geen pijn) en 10 (de ergst denkbare pijn).



Pill-camera-onderzoek

capsuleonderzoek, videocapsule-endoscopie (VCE)

Bij dit onderzoek slik je een minuscule camera in. Die is maar zo groot als een vitaminepil. Daarmee kunnen we de binnenkant van je darmen filmen en zo afwijkingen opsporen.



Plaskalender

mictielijst

Als je vaak moet plassen kan de uroloog veel informatie halen uit een plaskalender. Je houdt daarvoor 3 dagen en 3 nachten bij hoeveel je drinkt en meet je plasvolumes op.



Preoperatief onderzoek bij ouderen

Voor een operatie, volledige verdoving of sedatie, is het zinvol om bij oudere patiënten een bijkomend geriatrisch risicoprofiel op te maken.



Preoperatieve voorbereiding

preoperatief nazicht, preoperatieve screening (POS)

Het is belangrijk dat je voor een operatie de vragenlijst op mijn.zas.be zo snel en volledig mogelijk invult en onze verdere instructies opvolgt.



Preoperatieve voorbereiding bij kinderen

preoperatief nazicht, preoperatieve screening bij kinderen (POS)

Het is belangrijk dat je voor een operatie bij je kind de vragenlijst op mijn.zas.be zo snel en volledig mogelijk invult en onze verdere instructies opvolgt.



Provocatietest voor bronchiale hyperreactiviteit

histamineprovocatietest, metacholineprovocatietest

Met dit onderzoek gaan we de gevoeligheid van je luchtwegen na. Je ademt een oplossing met histamine of metacholine in, een prikkelende maar onschadelijke stof.



Röntgenonderzoek

radiografie, RX, RX-onderzoek, conventionele radiologie, röntgenfoto

Een röntgenonderzoek maakt met röntgenstralen of X-stralen weefsels en structuren van je lichaam zichtbaar. Soms krijg je eerst een contrastmiddel toegediend.



Single Balloon Enteroscopie (SBE)

SBE is een onderzoek van de dunne darm via een endoscoop met een ballon eraan. Door die op te blazen en leeg te laten kan de endoscoop zich diep door de dunne darm bewegen.



Prostaatbiopsie

biopsie prostaat, prostaatweefselonderzoek, transperineale prostaatbiopsie, MRI-geleide prostaatbiopsie

Als je mogelijk prostaatkanker hebt, neemt de uroloog met een holle naald stukjes weefsel uit de prostaat om te laten onderzoeken.



PSA-meting

PSA-onderzoek, PSA-test

PSA (prostaat specifiek antigeen) is een eiwit dat in de prostaat wordt gemaakt. Met een bloedonderzoek kan je arts de hoeveelheid PSA in je bloed meten.



Rugpijn onderzoeken

Een onderzoek om je rugpijn in kaart te brengen en eventueel een behandelplan op te stellen.



Slaaponderzoek

polysomnografie

Tijdens dit onderzoek bestuderen we je slaapstructuur, je ademhaling, je hartritme en de bewegingen van je lichaam 's nachts.



Slokdarmmanometrie met impedantiemeting

Bij dit onderzoek testen we of je slokdarm wel goed werkt. We brengen een dun buisje aan via je neus tot in je slokdarm.



SSEP

somato sensory evoked potential

SSEP test hoe je hersenen reageren op aanraking. We kijken dan hoe snel die gevoelsprikkels je hersenen bereiken.



Teleradiografie (TELE)

Dit is een radiologisch onderzoek waarbij röntgenfoto's het aangezicht in beeld brengen vanuit vooraanzicht en zijaanzicht.



Transcraniële duplex

Transcraniële duplex is een neurologische test met geluidsgolven om te kijken hoe het bloed in je hersenen stroomt en om problemen in je bloedvaten te vinden.



Sputumtest

Voor de behandeling van luchtweginfecties moeten we weten welke bacteriën in je luchtwegen zitten. Daarom laten we regelmatig fluimen (sputum) onderzoeken in het laboratorium.



Stembandonderzoek

kijkonderzoek stembanden en strottenhoofd, kijkonderzoek larynx, laryngoscopie

Bij een stembandonderzoek schuift de NKO-arts een soort flexibel buisje met daarop een camera (endoscoop) door je neus om de beweeglijkheid van je stembanden te bestuderen.



Thoraxdrain

Een thoraxdrain is een kunststof buis die tussen de twee longbladen geplaatst wordt om vocht en/of lucht weg te laten lopen of weg te kunnen zuigen.



Uitstrijkje

PAP-test, HPV-screening, baarmoederhalskankerscreening

De arts onderzoekt je baarmoederhals op de aanwezigheid van abnormale cellen of het humaan papillomavirus (HPV). Dat virus kan op termijn tot baarmoederhalskanker leiden.



Urinecytologie

Een urinecytologie geeft informatie over de eventuele aanwezigheid van kwaadaardige cellen in je urine.



Vaginale echografie

echoscopie van baarmoeder en eierstokken, inwendige gynaecologische echografie

Bij dit onderzoek brengen we voorzichtig vaginaal een sonde in die geluidsgolven uitstuurt. Die golven weerkaatsen op je organen, waardoor we ze op een scherm kunnen bekijken.



VEP

visual evoked potentials

VEP bekijkt hoe je hersenen reageren op flitsen of patronen. Zo controleren we of er problemen zijn bij het zien.



Weefselonderzoek bij (vermoeden van) kanker

pathologisch onderzoek, microscopisch onderzoek

Voor de diagnose van vaste tumoren is weefselonderzoek cruciaal. Daarvoor is meestal een biopsie of punctie van het verdacht weefsel aangewezen.

Behandelingen

 Filter deze pagina

1 - 330 van 330



Acromio-Claviculaire (AC) resectie

laterale clavicularesectie, chirurgisch verwijderen uiteinde sleutelbeen, acromio-claviculaire resectie

Het AC-gewricht verbindt je sleutelbeen met je schouder. Als je artrose hebt, kan de arts operatief het uiteinde van het sleutelbeen verwijderen om de pijn te verminderen.



Acromio-Claviculaire (AC) stabilisatie

acromio-claviculaire stabilisatie

Het AC-gewricht verbindt je sleutelbeen met je schouder. Dat gewricht kan uit de kom raken, zoals bij een val. Behandelingen zijn een draagverband, kinesitherapie of een operatie.



Alvleesklierchirurgie of pancreaschirurgie

pancreasoperatie, operatie aan de alvleesklier

Bij bepaalde aandoeningen aan de pancreas maakt een operatie deel uit van de behandeling, meestal om de aangetaste delen van de pancreas weg te halen.



Amandeloperatie

tonsillectomie

Bij een amandeloperatie neemt de NKO-arts via je mond je amandelen (tonsillen) weg.



Ambulante revalidatie voor ouderen

Ouderen met mobiliteitsproblemen kunnen in ZAS Vincentius multidisciplinaire revalidatie volgen. In ZAS Augustinus bieden we voor ouderen met dementie cognitieve training aan.



Analgetica

Analgetica zijn medicijnen die gebruikt worden om pijn te verzachten of weg te nemen. Ze werken op verschillende manieren in op het perifere of centrale zenuwstelsel.



Anterieure cervicale dissectomie en fusie

ACDF-operatie, operatie van een nekhernia

Dit is een mogelijke operatie bij een nekhernia. De arts verwijdert de beschadigde tussenwervelschijf en maakt enkele wervels aan elkaar vast. Dit verlicht de druk op de zenuwen.



Aponeurectomie

De ziekte van Dupuytren kan je vingers doen krommen. Een aponeurectomie is een operatie waarbij we slecht weefsel in je handpalm wegsnijden zodat je je vingers weer kan strekken.



AR-chirurgie voor het plaatsen van een prothese

augmented reality, AR-operatie, NextAR, AR-ingreep

Bij AR-chirurgie ziet de chirurg tijdens de ingreep zowel de operatietafel als informatie



Armlift

Een armlift is een ingreep om slappe of loshangende huid aan de binnenkant van de bovenarmen te corrigeren. De operatie gebeurt vaak in combinatie met liposuctie.

uit een CT-scan door een AR-bril. De arts

kiel weg te kijken tijdens de operatie

Artrodese

fusie, operatief vastzetten van een gewricht

Artrodese is een operatie waarbij de arts (een deel van) je gewricht vastzet. Je kan er dan minder vlot mee bewegen, maar de pijn verdwijnt.

Arthroscopie elleboog

kijkoperatie elleboog, arthroscopie elleboog

Een arthroscopie is een kijkoperatie. Via kleine sneetjes brengt de arts een camera en instrumenten in om de elleboog vanbinnen te bekijken en, indien nodig, ineens te behandelen.

Arthroscopie heup

kijkoperatie heup, arthroscopie heup

Een arthroscopie is een kijkoperatie. Via kleine sneetjes brengt de arts een camera en instrumenten in om de heup vanbinnen te bekijken en, indien nodig, ineens te behandelen.

Arthroscopie knie

kijkoperatie knie, arthroscopie knie

Een arthroscopie is een kijkoperatie. Via kleine sneetjes brengt de arts een camera en instrumenten in. Daarmee kan de arts het kniegewricht vanbinnen bekijken en ineens behandelen.

Arthroscopie schouder

kijkoperatie schouder, arthroscopie schouder

Een arthroscopie is een kijkoperatie. Via kleine sneetjes brengt de arts een camera en instrumenten in om de schouder vanbinnen te bekijken en, indien nodig, ineens te behandelen.

BARXX-behandeling

Barrx Radiofrequency Ablation System, RFA

Met de BARXX-methode verwijderen we beschadigd slijmvlies in de slokdarm voordat het kanker kan worden.

Behandeling astma

Dikwijls is een behandeling met een puffer nodig. De arts en/of verpleegkundige geeft uitleg over het gebruik ervan.

Behandeling blaaskanker

Bij blaaskanker zijn naast een operatie soms ook blaasspoelingen, chemotherapie,



Behandeling bronchiëctasieën

Bij de behandeling van bronchiëctasieën ligt de nadruk op het voorkomen van infecties.

immunotherapie of radiotherapie nodig. Je bespreekt wat bij jou van toepassing is.



Behandeling dysfagie

De logopedist maakt gebruik van revaliderende of compenserende technieken, of een combinatie van beide.



Behandeling en opvolging botontkalking en gewrichtslijden bij ouderen

geriatrisch zorgpad osteoporose - gewrichtslijden

In het geriatrisch dagziekenhuis gaan we na in hoeverre osteoporose bij jou aanwezig is en werken we een gepersonaliseerd zorgplan uit.



Behandeling en opvolging ijzertekort bij ouderen

Heb je een aanhoudend ijzertekort, ook al neem je ijzertabletten? Of verdraag je die tabletten niet goed? Dan kun je in het geriatrisch dagziekenhuis via een infuus ijzer krijgen.



Behandeling enkelfractuur

behandeling gebroken enkel

De behandeling van een gebroken enkel hangt af van het soort breuk. In veel gevallen volstaat het om een gipsverband te dragen, maar soms is er ook een operatie nodig.



Behandeling erectiestoornissen

Je leert een gezonde levensstijl ontwikkelen met voldoende beweging. Indien nodig schrijft de uroloog medicijnen voor. In heel specifieke gevallen is een penisprothese een optie.



Behandeling goedaardige prostaatvergroting met medicijnen

medicamenteuze behandeling goedaardige prostaatvergroting

Je kan medicijnen krijgen die plasklachten verbeteren en/of je prostaat verkleinen.



Behandeling goedaardige zwelling balzak

correctie goedaardige zwelling balzak, correctie balzakzwelling

Bij een hydrocoele herstel of spermatocele resectie neemt de arts de waterbreuk of cyste weg via een insnijding gemaakt in de huid van je balzak.



Behandeling heupfractuur

behandeling van een gebroken heup

Een heupfractuur is enkel via een operatie te behandelen. Hoe artsen je heupfractuur herstellen, hangt af van het fractuurtype, je leeftijd en de kwaliteit van je bot.



Behandeling hydrocoele bij kinderen

behandeling hydrocoele bij kinderen, behandeling vochtophoping in de balzak bij kinderen, behandeling waterbreuk bij kinderen

Vochtophoping in de balzak kan tot de leeftijd van twee jaar vanzelf verdwijnen. Na die leeftijd verwijdert de kinderuroloog het vocht tijdens een operatie.



Behandeling hydrocoele bij volwassenen

behandeling hydrocoele, behandeling vochtophoping in de balzak, behandeling waterbreuk

Hydrocoele is een ophoping van vocht tussen twee vliezen rond de teelbal. Daardoor zwelt de balzak op. De uroloog verwijdert het vocht tijdens een operatie en neemt het vlies weg.



Behandeling hypersensitiviteitspneumonitis

Soms kan stoppen van de oorzakelijke medicatie of ingeademde stof voldoende zijn maar vaak zijn immuunonderdrukkende medicijnen nodig.



Behandeling interstitieel longlijden

Medicijnen kunnen de ontstekingen in je longen onderdrukken. Welke medicijnen je precies krijgt, hangt af van de oorzaak. Je longarts zal je meer uitleg geven.



Behandeling klaplong

behandeling pneumothorax

Hoe de behandeling verloopt, hangt af van de soort en ernst van de klaplong. Soms is het nodig om een drain te plaatsen of een kijkoperatie uit te voeren.



Behandeling longhypertensie

De behandeling van longhypertensie hangt af van de oorzaak, de ernst en de aanwezigheid van andere ziekten. Je longarts zal je meer uitleg geven.



Behandeling longkanker

behandeling kwaadaardig longkankergezwel, kwaadaardige longtumor, longcarcinoom

Mogelijke behandelingen voor longkanker zijn een operatie, chemotherapie, immunotherapie, doelgerichte therapie en

radiotherapie. Je arts legt uit waarvoor jij in aanmerking komt.



Behandeling longontsteking

behandeling pneumonie

Een longontsteking kan meestal goed behandeld worden met antibiotica. Soms is een specifieke gerichte behandeling nodig.



Behandeling longvlieskanker

behandeling borstvlieskanker, asbestkanker

De meeste patiënten krijgen eerst immunotherapie. Daarna kunnen ze chemotherapie en/of radiotherapie krijgen. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt gekozen voor een operatie.



Behandeling met fillers

Een filler is een vloeibare gel die we gebruiken om diepe rimpels of groeven te verminderen, volume toe te voegen of de vorm van het gelaat te verbeteren.



Behandeling mucoviscidose

Bij mucoviscidose volgen we nauwgezet problemen met de longen en de spijsvertering op.



Behandeling nierkanker

Bij nierkanker zijn naast een operatie soms ook doelgerichte therapie, immunotherapie of radiotherapie nodig. Je arts bespreekt wat bij jou van toepassing is.



Behandeling pleuravocht

Je longarts plaatst een naald of een slangetje (thoraxdrain) tussen je ribben om het opgehoopte vocht tussen je longvliezen weg te halen.



Behandeling prostaatkanker

Mogelijke behandelingen voor prostaatkanker zijn actieve opvolging, een operatie, radiotherapie en hormoontherapie. Je arts legt uit waarvoor jij in aanmerking komt.



Behandeling sarcoïdose

Meestal gaat de ziekte vanzelf over. Soms is medicatie nodig om het immuunsysteem te onderdrukken.



Behandeling slaap- en waakstoornissen

Afhankelijk van het onderliggende probleem stelt een multidisciplinair team van artsen een specifieke behandeling voor jou voor.



Behandeling teelbalkanker

Bij teelbalkanker zijn naast een operatie soms ook chemotherapie of radiotherapie nodig. Je arts bespreekt wat bij jou van toepassing is.



Behandeling teelbaltorsie bij volwassenen

behandeling torsio testis, behandeling teelbaldraaiing

De uroloog draait tijdens een kleine ingreep de teelbal terug en maakt hem vast aan de balzak. Zonder operatie kan de teelbal definitieve schade oplopen.



Behandeling tuberculose

Als je tuberculose hebt, kan je in principe volledig genezen met antibiotica.



Behandeling urineverlies bij mannen

behandeling urine-incontinentie bij mannen

Mogelijke opties zijn levensstijlaanpassingen, bekkenbodemspieroefeningen, medicatie en/of de plaatsing van een male sling of kunstmatige sluitspier (urinaire sfincterprothese).



Behandeling urineverlies bij vrouwen

behandeling urine-incontinentie bij vrouwen

Mogelijke opties zijn bekkenbodemkine, medicatie en/of de plaatsing van een netje (suburethral sling), tape (TOT of TVT) of kunstmatige sluitspier (urinaire sfincterprothese).



Behandeling van spasticiteit

Behandeling van verhoogde spanning of stijfheid van de spieren of spiergroepen



Behandeling varicocele bij volwassenen

behandeling varicocele, behandeling spatader aan de teelbal

Varicocele is een spatader ter hoogte van de teelbal. De meest courante behandeling gebeurt bij de radioloog. Die maakt het bloedvat dicht onder plaatselijke verdoving.



Behandeling vernauwing plasbuis

urethrotomie, Sachse urethrotomie, urethroplastie

De uroloog kan meestal de vernauwing in je plasbuis met een kijkinstrument openmaken (urethrotomie). In zeldzame gevallen is een uitgebreidere open operatie nodig (urethroplastie).



Behandeling vernauwing urineleider bij volwassenen

ureter-reïmplantatie, heraanleg urineleider in de blaas, herstel vernauwing urineleider

Bij een vernauwing van de aanhechting van de urineleider en de blaas maakt de uroloog de urineleider los van de blaas en maakt die op een andere plaats terug vast aan de blaas.



Bekkenbodempkinesithherapie

bekkenbodempkinesithherapie, bekkenbodempkinesithérapie, bekkenbodempkinesithérapie, bekkenbodempkinesithérapie, bekkenbodempkinesithérapie

Met bekkenbodempkinesithherapie behandelen we blaasklachten, darmklachten of seksuele problemen die te maken hebben met het opspannen of ontspannen van de bekkenbodempkinesithérapie.



Bekkenbodempoperatie

Een operatie aan je bekkenbodem om bijvoorbeeld incontinentie of een endeldarmverzakking te behandelen.



Besnijdenis bij kinderen

circumcisie bij kinderen, besnijdenis bij kinderen

Bij een circumcisie of besnijdenis neemt de kinderuroloog een deel of de volledige voorhuid van de penis weg.



Besnijdenis bij volwassenen

circumcisie, besnijdenis

Bij een circumcisie of besnijdenis neemt de arts een deel of de volledige voorhuid van de penis weg om ontstekingen van de eikel of plasproblemen op te lossen.



Bewegingsprogramma bij de ziekte van Bechterew

spondylitis ankylosans revalidatie



Bewegingsprogramma bij kanker

oncologisch bewegingsprogramma, oncologische revalidatie, oncorevalidatie

Bij de ziekte van Bechterew zijn je gewrichten in je rug zo lang ontstoken, dat ze stijver worden en niet meer goed kunnen bewegen. Gerichte oefeningen kunnen dan helpen.



Bijnierchirurgie

Ook wel adrenalectomie genoemd. De arts verwijdert operatief één of beide bijnieren. Je bijnieren zorgen voor een goede bloeddruk en produceren verschillende hormonen.

Niet alleen de ziekte, maar ook de kankerbehandeling zijn zwaar voor je lichaam. Met ons bewegingsprogramma helpen we je om je energie, conditie en welzijn weer op peil te brengen.



Billift

gluteale lift

Bij een billift wordt de overtollige huid ter hoogte van de billen aangespannen. We kunnen ook het volume van de bil vergroten met je lichaamseigen vetweefsel.



Biologicals en biosimilars

Biologicals zijn medicijnen die heel specifieke signaaleiwitten uitschakelen en zo ziekteprocessen (zoals reumatoïde artritis, psoriasis of inflammatoire darmziekten) beïnvloeden.



Blaassonde

blaaskatheter

Er bestaan twee soorten blaassondes. Een transurethrale blaassonde wordt via je plasbuis in je blaas ingebracht. Bij een suprapubische blaassonde gebeurt dat via je buikwand.



Blaasspoeling

blaasinstillatie, mitomycine instillatie, BCG-spoeling

Om te verhinderen dat blaaspoliepen terugkomen of verergeren, krijg je medicijnen toegediend in je blaas. De uroloog bepaalt hoeveel blaasspoelingen in jouw geval nodig zijn.



Blaasverwijdering

wegname blaas, radicale cystectomie met Bricker urostoma of neoblaas, robot geassisteerde radicale cystectomie, RARC

Bij die ingreep onder volledige verdoving neemt de uroloog je blaas weg en zorgt ervoor dat de urine kan afvloeien via een urostoma of een nieuwe blaas.



Bloedtransfusie

Bij een bloedtransfusie krijg je via een infuus bloed van een donor toegediend. Dat kunnen



Borstlift

mastopexie

rode bloedcellen (erythrocyten), bloedplaatjes (trombocyten) of plasma zijn.

Bij een borstlift herstellen we de positie en vorm van de afhanginge borst. We verwijderen overtollige huid, liften de tepel en herschikken het borstweefsel tot een stevigere vorm.



Borstvergroting

borstaugmentatie, augmentatieve mammoplastiek

Bij een borstvergroting vergroten we het volume van je borsten. Hiervoor gebruiken we je eigen vetweefsel of een silicone prothese of implantaat.



Borstverkleining

borstreductie

Te zware of hangende borsten veroorzaken soms problemen zoals nek- en rugpijn, of ongemakken bij het sporten. Je borsten operatief laten verkleinen kan dan een oplossing zijn.



Bot verwijderen

Artsen verwijderen extra botweefsel zodat enkel gezond bot en kraakbeen overblijft.



Botoxbehandeling bij neurologische aandoeningen

inspuiting met botox

We spuiten een kleine hoeveelheid botulinumtoxine of botox in bepaalde spieren in. Dat zorgt ervoor dat de zenuwen geen signaal naar die spieren sturen. Ze worden verlamd.



Botoxbehandeling uit esthetische overwegingen

Botulinetoxine is een stof die we gebruiken om je gezichtsspieren te ontspannen en dynamische rimpels zoals fronslijntjes of kraaienpootjes tijdelijk minder zichtbaar te maken.



Botuline-injecties

botulinebehandeling

Bij oogspasmen kan de oogarts botulinetoxine inspuiten. Soms worden botuline-injecties gebruikt om rimpels te vervagen. Dan hebben ze een esthetisch doel.



Buikwandchirurgie

Een operatie aan je buik om bijvoorbeeld een buikwandbreuk, liesbreuk, littekenbreuk of navelbreuk te behandelen.



Burton-Pelligrini

behandeling duimbasisartrose

Dit is een operatie om artrose onderaan je duim te behandelen. De arts verwijdert het botje dat met artrose is aangetast en vervangt het door een pees uit je voorarm.



Cheilectomie

Een cheilectomie is een mogelijke operatie bij artrose. De arts verwijdert beenderige aanwasten rond je gewricht zodat je weer soepel kan bewegen en minder pijn hebt.



Chirurgie bij huidziekten

Chirurgie is het wegsnijden van een stukje huid of gezwel. Dit doen we onder lokale verdoving. De huid wordt terug afgesloten met hechtingen.



Chronisch nierlijden zorgtraject



Buikwandcorrectie

abdominoplastie

Door zwangerschap of een gewichtsschommeling kan je buikwand verslappen. Met deze ingreep corrigeren we de huid, het onderhuids vetweefsel en de verslachte spieren.



Cataractoperatie

cataractchirurgie, staaroperatie, cataractingreep

Tijdens deze ingreep verwijderen we de troebele ooglens en vervangen ze door een heldere implantlens in kunststof. Die gaat in principe levenslang mee.



Chemotherapie

behandeling met cytostatica of cytotoxische middelen

Chemotherapie is een behandeling met geneesmiddelen die de groei van kankercellen afremmen of de celdeling verstoren.



Cholangioscopie

Cholangioscopie is een ingreep om de galwegen te onderzoeken of behandelen. De arts brengt een flexibele, dunne buis via het biopsiekanaal van een moeder-endoscoop in de galweg.

Samen met je huisarts doen we ons best om te vermijden dat je nieren verder verslechteren. We proberen te voorkomen dat je in een ernstige fase van nierfalen terechtkomt.



Correctie afstaande oren

otoplastie, correctie 'flaporen'

Bij deze operatie corrigeren we de stand en eventueel de vorm van je oren.



Corticosteroiden

cortisonen

Corticosteroiden zijn een synthetische variant van het bijnierschorsormoon. Ze onderdrukken ontstekingsreacties in het lichaam.



Cryotherapie

Met Cryotherapie behandelen we huidaandoeningen door middel van bevriezing.



Dementiezorg voor ouderen

Voor dementie bestaat er momenteel geen genezende behandeling. We kunnen wel proberen het verstandelijk verlies en het verlies aan zelfredzaamheid tijdelijk te vertragen.



Dento-alveolaire chirurgie

orale chirurgie, stomatologie

Dento-alveolaire chirurgie zijn chirurgische ingrepen van de boven- en onderkaak, bij de tanden en kiezen.



Desensibilisatietherapie voor wespengif, huisstofmijt en pollen

Je krijgt meermaals een lage dosis toegediend van de stof waarvoor je allergisch bent. De dosis wordt geleidelijk opgevoerd totdat die stof geen allergische reactie meer uitlokt.



Diabeteszorg

Op de dienst Endocrinologie kan je terecht voor de opvolging van zowel diabetes type 1 als type 2 en zwangerschapsdiabetes.



Diagnose en opvolging geheugenproblemen



Dialyse

Dit zorgpad laat toe om onzekerheden weg te nemen, een eenvoudige screening uit te voeren en tijdig in te grijpen op corrigeerbare geheugenklachten.

Wanneer de nieren zo goed als niet meer werken, kunnen afvalstoffen kunstmatig uit het lichaam gefilterd worden. Dat heet dialyse. Er zijn verschillende vormen van dialyse.



Dialysekatheter

Artsen plaatsen een buisje ter hoogte van een ader in de hals. Deze ingreep gebeurt via een klein sneetje ter hoogte van de borstkas en in de hals bij lokale of algemene verdoving.



Dijlift

Een dijlift is een ingreep om huid- en vetoverschot aan de dijen te corrigeren. De operatie gebeurt vaak in combinatie met liposuctie.



Dilatatie

Bij een dilatatie rekken we een orgaan dat te nauw is, voorzichtig weer open. Meestal gebruiken we hiervoor een soort ballon of een buisje (sonde).



Duple arthrodese

Een operatie waarbij artsen 2 gewrichten vastzetten. Het zijn gewrichten in je achtervoet die vooral instaan voor kantel- en draaibewegingen. Je enkel kan je blijven bewegen.



Doelgerichte therapie

doelgerichte medicijnen, targeted therapy

Doelgerichte geneesmiddelen werken in op specifieke eigenschappen van de kankercellen. Ze blokkeren bepaalde processen die leiden tot celdeling.



Dringende psychiatrische zorg voor volwassenen

crisiszorg psychiatrie, urgentiepsychiatrie, crisisinterventie psychiatrie, dringende psychiatrische zorg

We behandelen volwassenen die een ernstige psychiatrische crisis doormaken. Een opname is noodzakelijk, omdat de crisis risico's inhoudt voor henzelf of voor anderen.



DRUJ prothese

Distal Radioulnar Joint prothese



Duimprothese

Bij een duimprothese vervangt de arts het beschadigde kraakbeen van je duimgewricht door een kunstgewricht.

Deze prothese in je onderarm vervangt het draaigewricht tussen je spaakbeen en je ellepijp. Hierdoor kan je je pols opnieuw draaien en heb je minder pijn.



Echogeleide infiltratie

Bij een echogeleide infiltratie geven we je een injectie terwijl we een echografie uitvoeren. Zo kunnen we de naald gericht sturen en zien we beter waar de medicatie terecht komt.



Elektrocoagulatie

Bij elektrocoagulatie branden we huidweefsel weg. Dit gebeurt onder verdoving.



Elleboogprothese

Artsen vervangen je eigen elleboog door een kunstelleboog. Deze ingreep vindt enkel plaats als je elleboog onherstelbaar beschadigd is en je niet meer zonder pijn kan bewegen.



Endoscopische behandeling van een Zenker-divertikel

Bij deze ingreep maken we een sneetje in de slokdarm om een Zenker-divertikel te behandelen. Een Zenker-divertikel is een uitstulping in je slokdarm.



Endoscopische mucosale resectie (EMR)

Bij een EMR halen we slijmvlies weg uit je slokdarm, maag of dikke darm. Dat slijmvlies onderzoeken we. Daarna proberen we het slechte weefsel weg te nemen.



Endoscopische submucosale dissectie (ESD)

ESD is een manier om afwijkend weefsel van het slijmvlies in de slokdarm, darm of maag weg te halen. Hiervoor brengt de arts kleine instrumenten in via een endoscoop.



Enkelprothese

Bij een enkelprothese vervangt de arts het enkelgewricht door een kunstgewricht. Het kan een oplossing zijn bij pijnlijke artrose die niet anders verholpen kan worden.



Epidurale infiltratie

interventionele pijnbehandeling

De pijnarts plaatst na lokale verdoving een fijne naald tot in de ruimte rond je ruggenmerg en de zenuwwortels die daaruit

ontstaan en spuit daar pijnstillende medicatie



Epidurale verdoving

epidurale ruggenprik, epidurale anesthesie, peridurale analgesie

Met een epidurale ruggenprik blokkeert de anesthesist tijdelijk de doorstroming van pijnprikkels naar de hersenen.

in



Epidurale verdoving bij bevalling

epidurale ruggenprik, peridurale analgesie bij bevalling, epidurale anesthesie

De doeltreffendste methode van pijnstilling tijdens de arbeid en de bevalling is de epidurale verdoving of ruggenprik.



ERCP

Endoscopische Retrograde Cholangio Pancreaticografie

We brengen een contrastvloeistof aan in je galwegen of pancreasgang om er beter beelden van te kunnen maken. De arts gaat na wat het probleem is, en kan het ook meteen behandelen.



Ergotherapie

De ergotherapeut leert je om zelfstandig je dagelijkse handelingen uit te kunnen voeren, bijvoorbeeld door je omgeving zo goed mogelijk in te richten.



Facelift

Een facelift is een ingreep die de tekenen van veroudering aan je gezicht en hals vermindert. Via een snee voor het oor spannen we de huid en onderliggende weefsellaag aan.



Facetbehandeling

De pijnarts stelt een facetbehandeling voor als die vermoedt dat je pijnklachten hun oorsprong vinden in je facetgewrichten. Dat zijn kleine zijgewrichtjes tussen je wervels.



Galblaas- en galwegenchirurgie

Een operatie aan je galblaas of galwegen waarbij de chirurg pijnlijke galstenen verwijdert



Gedeeltelijke verdoving

regionale verdoving, regionale anesthesie, locoregionale verdoving, locoregionale anesthesie

Bij een gedeeltelijke verdoving maakt de anesthesist een bepaald deel van je lichaam gevoelloos en bewegingloos.



Gewrichtsprothese

Bij een gewrichtsprothese vervangen we je gewricht door een kunstgewricht. Mogelijke oorzaken zijn slijtage, een breuk, een aangeboren afwijking of het afsterven van het gewricht.



Gezinsbegeleiding

Gezinsbegeleiding helpt gezinnen om beter met elkaar om te gaan en problemen op te lossen door middel van gesprekken en oefeningen.



Glaucoomoperatie

glaucoomchirurgie

Als je oogdruppels hebt gebruikt en de oogdruk te hoog blijft, kunnen we met een fijne ingreep een doorgang maken van de oogbol naar de omliggende weefsels en zo de druk verlagen.



Hallux-chirurgie

operatie aan de grote teen

Hallux is Latijn voor grote teen. Hallux-chirurgie is dus een operatie aan de grote teen, bijvoorbeeld wanneer die scheef staat (hallux valgus) of verstijfd is (hallus rigidus).



Halslift

Een halslift is een ingreep om de huid ter hoogte van de hals strakker te maken en overtollig vet te verwijderen. Dit kan in combinatie met een facelift.



Halve knieprothese

unicompartimentele knieprothese, UKP

Bij een halve prothese wordt alleen het beschadigde deel van het gewricht vervangen door een kunstversie. In de meeste gevallen voelt dit aangenamer dan een volledig nieuwe knie.



Handrevalidatie

Bij een handprobleem zoals een breuk, reuma, een peesontsteking, een amputatie of een ziekte helpen we je om je hand opnieuw te leren gebruiken. We geven ook tips over ergonomie.



Hartrevalidatie

cardiale revalidatie, cardiologische revalidatie

Bij cardiologische revalidatie leer je oefeningen om de conditie van je hart weer op te bouwen na bijvoorbeeld een hartaanval of een hartoperatie.



Hemodialyse

Bij hemodialyse leiden we het bloed van de patiënt door een kunstnier om het bloed te zuiveren. Meestal zijn er wekelijks 3 dialysesessies van elk 4 uur nodig.



HIPEC-chirurgie (Hypertherme Intra Peritoneale Chemoperfusie)

Een combinatie van chirurgie en chemotherapie om één of meerdere tumoren uit je buikholte te verwijderen.



Hoornvliestransplantatie

hoornvliesgreffe, corneagreffe, corneatransplantatie

Bij een hoornvliesgreffe vervangt de oogarts het troebel of onregelmatig geworden hoornvlies (cornea) door gezond hoornvlies van een donor.



HPV-vaccinatie

HPV-vaccin, HPV-preventie

HPV-vaccinatie verhoogt je bescherming tegen HPV: een virus dat kanker kan veroorzaken. Het vaccin werkt preventief en helpt dus niet als je al besmet bent.



Huidgreffe

huidtransplantatie

Artsen vervangen beschadigde huid door dat van een ander lichaamsdeel. Deze ingreep voeren artsen uit als een wond niet meer met hechtingen kan sluiten.



Huidtumor verwijderen

Je kan bij de plastisch chirurg terecht voor het verwijderen van goedaardige en kwaadaardige huidletsels, zowel om medische als esthetische redenen.



Hyperbare zuurstoftherapie

Hyperbare zuurstoftherapie is een therapie die we inzetten om zuurstoftekort in beschadigde weefsels te herstellen.



Hysterectomie

baarmoederverwijdering, baarmoeder weghalen

Een hysterectomie is een chirurgische ingreep waarbij de arts de baarmoeder geheel of gedeeltelijk wegneemt.



Immunotherapie

immuuntherapie



Infiltratie

Bij immunotherapie wordt je immuunsysteem met geneesmiddelen aangepast of versterkt om kankercellen te bestrijden en te vernietigen.

Infiltratie is een techniek waarbij een naald tot de bron van de pijn gaat. Daarna spuiten we een medicijn, ontstekingsremmer of pijnstiller in. Dit kan je klachten verminderen.



Infiltraties (van gewrichten)

inspuiting, gewrichtspunctie

Een infiltratie is een lokale behandeling waarbij we vocht uit een gewricht halen en er medicatie inspuiten.



Infiltraties bij het carpaletunnelsyndroom

inspuiting met ontstekingsremmers

Het carpaletunnelsyndroom omvat klachten in de hand en onderarm. We spuiten ontstekingsremmers in de pols om ontsteking en druk op de zenuw te verminderen.



Infiltraties bij meralgia paresthetica

inspuiting met ontstekingsremmers

Meralgia paresthetica is een beknelde zenuw in het bovenbeen. We spuiten ontstekingsremmers rond de heupkam om pijn te verlichten.



Infiltraties bij occipitalisneuralgie

inspuiting met ontstekingsremmers

Occipitalisneuralgie is een ziekte waarbij de zenuwen in de nek en achterkant van het hoofd ontstoken raken. We spuiten ontstekingsremmers rond de zenuw om pijn te verlichten.



Ingrepen om geen bril of contactlenzen te moeten dragen

refractieve chirurgie, refractiechirurgie, refractieve oogchirurgie, refractieve oogheelkunde

Bij refractieve oogchirurgie passen we de breking van het licht in je oog zo aan dat het op de juiste plaats op het netvlies terechtkomt.



Inhalatietherapie

Bij deze therapie adem je medicijnen in via een apparaat. Afhankelijk van de aandoening en het medicijn kan het gaan over verschillende apparaten.



Interventionele pijnbehandeling

interventionele pijntherapie, interventionele pijnbestrijding

Bij een interventionele pijnbehandeling richt de pijnarts zich op de zenuw die de pijn signalen doorgeeft naar je hersenen.



Inwendige en uitwendige neuscorrectie

septorhinoplastie

Bij een in- en uitwendige neuscorrectie veranderen we de vorm van je neus om de functie en/of het uitzicht van je neus te verbeteren.



Kijkoperatie borstkas

video-assisted thoracoscopic surgery, video-assisted thoracic surgery, VATS

Deze kijkoperatie is op dit moment de meest gebruikte techniek. Onder volledige verdoving (narcose) maakt de chirurg 1, 2 of 3 kleine sneetjes in de borstkas holte.



Kijkoperatie keel en strottenhoofd

pandendoscopie

Met een soort buis (scoop) bekijkt de arts je mond- en keelholte, strottenhoofd, luchtpijp en slokdarm. Het doel is om verdachte weefsels op te sporen en te laten onderzoeken.



Intrathecale pijnpomp

intrathecale pijntherapie, intrathecale morfiepomp

Bij deze behandeling krijg je via een pijnpomp medicijnen toegediend in de intrathecale ruimte. Dat is de ruimte rond je ruggenmerg v. ruggenmergvocht in zit.



Katheters en poortkatheters plaatsen

Een katheter is een buisje dat we in een ader inbrengen om medicatie toe te dienen (bv. bij chemotherapie) of om bloedstalen te nemen.



Kijkoperatie hogere urinewegen

ureterorenoscopie, URS, flexibele of rigide uretero(reno)scopie, RIRS

Met een ureterorenoscopie kan de uroloog stenen of poliepen in je urinewegen of nier behandelen.



Kindgerichte begeleiding

Kindgerichte begeleiding helpt kinderen met emotionele en gedragsproblemen door middel van gesprekken, spel en activiteiten op het niveau van het kind.



Kinesithherapie

De kinesitherapeut leert je oefeningen om de werking van een bepaald lichaamsdeel te herstellen of te verbeteren. Je oefent bijvoorbeeld je kracht, flexibiliteit of evenwicht.



Klassieke reumamedicatie

Klassieke reumamedicatie onderdrukt gewrichtsontstekingen.



Knieprothese op maat

maatprothese

Een knieprothese is een kunstknie. Bij een maatprothese wordt op basis van een CT-scan gekeken hoe de prothese best gepositioneerd wordt volgens jouw specifieke anatomie.



Langdurige psychiatrische zorg voor volwassenen met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA)

langdurige psychiatrische zorg

Volwassenen met een ernstige psychiatrische aandoening die voor een langere periode



Kinesithherapie rond de bevalling

perinatale kinesithherapie, prenatale kinesithherapie, postnatale kinesithherapie

Met kinesithherapie maak je de spieren van je bekkenbodemp weer sterker na een bevalling of bereid je je voor op de bevalling met oefeningen en ademhalingstechnieken.



Klinische studies Oncologie

experimentele kankerbehandeling, trial

Klinische studies vormen de basis van de medische vooruitgang. Ze onderzoeken nieuwe behandelingen of nieuwe combinaties van behandelingen en hun werkingsmechanisme.



Kortdurende psychiatrische zorg voor volwassenen

kortdurige psychiatrische zorg, acute psychiatrische zorg

We behandelen volwassenen met diverse psychische klachten. Zo stellen we samen een zorgprogramma op maat op waarin we zowel individueel als in groep aan de slag gaan.



Laserbehandeling voor oogandoeningen

Bij een laserbehandeling richten we een heel dunne, felle en zuivere lichtstraal op een deel van je oog. Hoe vaak je de behandeling moet krijgen, hangt af van je aandoening.

nood hebben aan een intensieve begeleiding kunnen in ons langdurige zorgtraject terecht.



Latarjet stabilisatie

operatieve schouderstabilisatie, Latarjet-operatie

Latarjet is een operatie om je schouder stabiel te maken zodat die minder snel uit de kom schiet. Hiervoor verplaatst de arts een stukje bot en pees binnen het schouderblad.



Ligamenten vastzetten

Een operatie waarbij artsen losgekomen ligamenten, zoals bij een skiduim, terug vastzetten op het bot. Dit met behulp van een ankertje.



Liposuctie

liposculptuur, vetverwijdering

Bij een liposuctie verwijderen we onderhuids vet door het weg te zuigen. Zo verminderen we lokaal opgestapeld vet.



Littekencorrectie

Een operatie waarbij de chirurg het huidige litteken uitsnijdt en de opening opnieuw aan elkaar hecht.



Longrevalidatie

pulmonaire revalidatie, respiratoire revalidatie

Longrevalidatie is een reeks van oefensessies om patiënten met longproblemen te helpen om beter te ademen en hun conditie en kracht te verbeteren.



Lumbale laminectomie

wervelboog verwijderen

Bij deze operatie verwijdert de arts een stuk bot (je wervelboog) om meer ruimte in je onderrug te maken. Dat verlicht de druk op de zenuwen en vermindert de pijn.



Maagballon

Een maagballon is een ballon die we in je maag plaatsen. Hierdoor voelt het alsof je maag sneller vol is. Het is een manier om gewicht te verliezen. De ingreep is zeldzaam.



Maagchirurgie

Een operatie aan je maag om bijvoorbeeld kwaadaardige tumoren in je maag te verwijderen.



Maagsonde

Een maagsonde is een kunststof buisje dat via de neus of uitzonderlijk via de mond naar de slokdarm tot in de maag geplaatst wordt.



Maagverkleining maagpouch via slokdarm

Ook wel Transoral Outlet Reduction (TORe) genoemd.



Maagverkleining via de slokdarm

Ook endoscopische sleeve gastroplastiek of ESG genoemd. Via je slokdarm verkleint de chirurg je maag met verschillende hechtingen.



Mediaal Patellofemoraal Ligament (MPFL) reconstructie

reconstructie Mediaal Patellofemoraal Ligament

Het MPFL is een gewrichtsband die je knieschijf op zijn plaats houdt. Bij de operatie vervangt de arts de beschadigde of zwakke gewrichtsband door een pees uit je eigen hamstring.



Medicamenteuze behandeling

Bij een medicamenteuze behandeling krijg je een voorschrift op maat van de aandoening voor het te behandelen probleem.



Medicatie voor reuma

De behandeling van reumatische aandoeningen is afhankelijk van het type reuma en van de patiënt zelf.



Microscopische discectomie

discectomie

Een discectomie is een operatie bij een discushernia: een uitpuilende tussenwervelschijf die tegen een zenuw aandrukt. De arts verwijdert de schijf om de druk te verlichten.



Middenoorinspectie

We bekijken en controleren de beweeglijkheid van de gehoorbeentjes en proberen je gehoor te verbeteren. Als er een gaatje in je trommelvlies zit, maken we dat ook dicht.



Nauwkeurige opvolging, controle en ondersteuning

Nauwkeurige opvolging, controle en ondersteuning van vitale functies en parameters (temperatuur, bloeddruk ...) om zo complicaties te voorkomen door snel in te



Neusbreukherstel

reductie neusfractuur

Bij deze ingreep zetten we na een breuk je neus weer recht.



Neustussenschotcorrectie

septumcorrectie, septoplastie

Het neustussenschot (septum) verdeelt je neus in 2 holtes. Bij een neustussenschotcorrectie zetten we het opnieuw recht zodat je weer beter door je neus kan ademen.



Niersteenpreventie

Om niersteenvorming te voorkomen geven we je richtlijnen over hoeveel je best drinkt en wat je wel/niet eet. Ook kunnen we soms preventieve medicatie opstarten.



Neurostimulatie

ruggenmergstimulatie, spinal cord stimulation (SCS), zenuwwortelstimulatie, dorsal root ganglion (DRG)

Een neurostimulator geeft via elektroden op je huid lichte elektrische impulsen in de ruimte rond je ruggenmerg en onderbreekt zo



Neuscorrectie

rhinoplastiek

Met een neuscorrectie wijzigen we de vorm of grootte van de neus. Dat gebeurt om esthetische redenen, maar soms ook om ademhalingsproblemen te verhelpen.



Nierdrain

nefrostomiekatheter (NSK), percutane nefrostomie (PCN), nefrodrain

Als je urineleider verstopt is, plaatsen we via een klein aanprikgaatje in je flank een drain (slangetje) in je nier. Die drain zorgt ervoor dat de urine uit je nier kan afvloeien.



Niersteenverbrijzeling

Extracorporele Shock Wave Lithotripsie, ESWL

De uroloog richt uitwendige schokgolven van hoge intensiteit zo precies mogelijk op de nierstenen om ze te verbrijzelen.



Niertransplantatie



Niersteenverwijdering door de huid

percutane niersteenverwijdering, percutane nefrolitholapaxie (PNL), PCNL, nefrolithotomie

Bij een niertransplantatie krijgt u een donornier. Uw arts beoordeelt of u in aanmerking komt en volgt u nadien op. De ingreep gebeurt in een Belgisch transplantatiecentrum.



Nierverwijdering

verwijdering of wegname nier of een gedeelte ervan, verwijdering niergezwel of niertumor, partiële of radicale nefrectomie, robot geassisteerde partiële nefrectomie, RAPN

Bij een (partiële) nefrectomie neemt de uroloog (een deel van) je nier weg. Soms wordt ook de urineleider weggenomen, in dat geval spreken we over een nefro-ureterectomie.



Niet-invasieve beademing

niet-invasieve ventilatie, thuisventilatie, non-invasieve ventilatie, NIV

Bij sommige aandoeningen is je lichaam niet meer in staat om op een juiste manier zuurstof op te nemen en koolzuur uit te ademen. Een thuisbehandeling kan mogelijk aangewezen zijn.



Oefenprogramma bij fibromyalgie

Wie aan fibromyalgie lijdt, heeft last van spierpijn. Bewegen in water (hydrotherapie) kan dan deugd doen, omdat het lichaam onder water je gewicht niet hoeft te dragen.



Oncologische slokdarmheelkunde

Een operatie aan je slokdarm om kwaadaardige tumoren in je slokdarm te verwijderen.



Ontstekingsremmende pijnstillers bij reuma

NSAID's (Non-Steroidal Anti Inflammatory Drugs)

Ontstekingsremmende pijnstillers zijn geneesmiddelen die ontstekingen verminderen en pijn verlichten.



Ooginjecties

intravitreale injecties (IVI), oogprik in glasvochtruimte

Bij deze ingreep injecteert de oogarts medicijnen rechtstreeks in het glasvocht (vitreum) van het oog om bepaalde netvlies-aandoeningen te behandelen.



Oogkasoperatie

orbitotomie, orbitachirurgie

Bij deze ingrepen worden breuken in de oogkas hersteld, biopten genomen van de oogkas of tumoren verwijderd.



Oorcorrectie

correctie afstaande oren, correctie 'flaporen', otoplastie

Een oorcorrectie is een operatie waarbij we afstaande oren corrigeren en dichterbij het hoofd brengen. De ingreep kan zowel bij kinderen als volwassenen uitgevoerd worden.



Operatie bicepspees ruptuur

opnieuw vastzetten van de bicepspees

De biceps, een spier in je bovenarm, zit met een pees vast aan je onderarm. Soms scheurt die pees, bijvoorbeeld tijdens een val. Tijdens een operatie maakt de arts die weer vast.



Operatie bij hallux rigidus

operatie teenartrose, stijve grote teen opereren

Deze ingreep kan je laten uitvoeren wanneer je grote teen stijf is omdat het kraakbeen in het gewricht versleten is.



Ooglidcorrectie

dermatochalasiscorrectie, blefaroplastie

Tijdens een ooglidcorrectie neemt de oogarts of plastisch chirurg overtollige huid en/of vet weg van de bovenste en/of onderste oogleden.



Operatie aan je lever

Je lever maakt gal, stollingsfactoren en eiwitten aan. Het zet ook voedingsstoffen om naar energie.



Operatie bij endeldarm- of rectumkanker

De chirurg verwijdert operatief je endeldarm en het omliggende weefsel. Als de kwaadaardige tumoren naast je sluitspier liggen, dan neemt de arts ook je sluitspier en je anus weg.



Operatie bij hallux valgus

hallux-valgus-operatie, operatie scheve grote teen

Een hallux-valgus-operatie is een ingreep die je kan laten uitvoeren als je grote teen scheef staat en pijnlijk is. De arts zet dan de botten van je teen weer recht.



Operatie carpaletunnelsyndroom



Operatie borstkas (open heekunde)

Thoracotomie

Bij een thoracotomie maken artsen de borstkas open tussen de ribben, een

Bij het carpaletunnelsyndroom zit er een zenuw gekneld in je pols. Tijdens de operatie maakt de arts de tunnel waarin de zenuwen zitten weer open. Dat verlicht de druk.



Operatie De Quervain tendinitis

operatie De Quervain-tenosynovitis, operatie De Quervain-syndroom

Tijdens deze operatie maakt de arts meer plaats in de tunnel waarin de pezen van je pols lopen. Dat vermindert de constante wrijving en dus ook de pijn en de ontsteking.



Operatie scaphoid fractuur

operatie gebroken scheepsbotje

Als het scheepsbotje in je pols gebroken is, kan een operatie nodig zijn. De arts herstelt dan de vorm en zet het bot eventueel vast met een metalen pin of schroef.



Operatie springvinger

behandeling triggerfinger

Een springvinger klikt of hapert bij het buigen en strekken. Dat komt door een verdikte pees. Tijdens de ingreep maakt de arts meer ruimte voor de pees zodat die weer kan bewegen.



Operatie tegen snurken en slaapapneu

uvulopalatopharyngoplastie (UPPP)

Bij deze operatie verkleinen we het zachte gehemelte. In het geval van slaapapneu nemen we ook je keelamandelen weg.



Operatie tenniselleboog

Een tenniselleboog is een ontsteking van de pezen die de pols doen strekken. Als andere behandelingen niet helpen, kan een operatie nodig zijn om de ontsteking weg te nemen.



Operatie van een ingegroeide teennagel

De chirurg behandelt en verwijdert operatief de ingegroeide teennagel.



Opvoedingsondersteuning

Opvoedingsondersteuning helpt ouders bij het begrijpen en aanpakken van gedrags- en ontwikkelingsproblemen van hun kinderen door middel van advies, training en begeleiding.



Opvolging incontinentie bij ouderen

In het geriatisch dagziekenhuis proberen we te achterhalen hoe het komt dat je ongewild urine of stoelgang verliest en stippelen we een gepersonaliseerd zorgplan voor je uit.



Opvolging ouderen met hartfalen

zorgpad Cardiologie – Geriatrie

Via dit zorgpad kunnen we ouderen met hartfalen op een ambulante manier medisch deskundig behandelen.



Opvolging valrisico en spierverlies bij ouderen

Via dit zorgpad proberen we de oorzaken van het verhoogde valrisico en het spierverlies te achterhalen en stellen we een gepersonaliseerd zorgplan voor jou op.



Opvolging vermagering en slikproblemen bij ouderen

Via dit zorgpad proberen we de oorzaken van slikproblemen en vermagering te



Opvolging gebruik verschillende medicijnen bij ouderen

opvolging polyfarmacie bij ouderen

De priater bekijkt in overleg met de klinisch



Opvolging na niertransplantatie

Na uw transplantatie volgen we u op, controleren uw transplantnier en regelen uw medicatie. Stipte medicatie inname en een gezonde levensstijl blijven essentieel.



Opvolging ouderen met kanker

zorgpad Oncologie – Geriatrie

Via dit zorgpad doen we bij ouderen met kanker een geriatische evaluatie en koppelen die terug naar de behandelend oncoloog of orgaanspecialist.



Opvolging van de medicatie

Medicatie-opvolging betekent dat we regelmatig kijken of de medicijnen goed werken.



Orchidopexie bij volwassenen

behandeling niet (volledig) of verkeerd ingedaalde teelbal, behandeling niet (volledig) of verkeerd ingedaalde testis, behandeling niet-scrotale testis, behandeling cryptorchidie

achterhalen en stellen we een gepersonaliseerd zorgplan voor jou op.

Via een klein sneetje in de lies en/of balzak plaatst de uroloog de niet-ingedaalde teelbal in de balzak en maakt hem daar vast.



Orthese

Een orthese is een hulpmiddel dat een lichaamsdeel beschermt of ondersteunt, zoals een korset of steunzolen. Het is niet hetzelfde als een prothese, dat een lichaamsdeel vervangt.



Orthopedische revalidatie

Tijdens dit oefenprogramma bouwen we je kracht op, vergroten we de beweeglijkheid van je gewricht en verbeteren we de stabiliteit van het gewricht en lichaam.



Osteotomie van de kaak

kaakcorrectie

Bij een osteotomie verplaatsen we de boven- en/of onderkaak om bijvoorbeeld een verkeerde beet te corrigeren. Dit omvat ook esthetische profielcorrecties.



Osteotomie van de knie

standcorrectie

Een osteotomie van de knie is een operatie waarbij de stand van je been wordt aangepast om je knie te ontlasten.



Ouder-kindbegeleiding

Ouder-kindbegeleiding helpt ouders en kinderen om beter met elkaar om te gaan door middel van gesprekken, spel en activiteiten.



Ouderbegeleiding

Ouderbegeleiding helpt ouders om te gaan met de uitdagingen van het opvoeden door middel van advies, ondersteuning en praktische tips.



Parkinsonrevalidatie

Door de ziekte van Parkinson sterven er zenuwcellen af. Hierdoor kan je minder goed bewegen. Met Parkinsonrevalidatie leren



PDT

Photodynamische therapie (PDT) is een behandeling waarbij we een lichtgevoelige crème op de huid aanbrengen en activeren met een rode lamp.

andere, gezonde zenuwcellen om functies



Peesbehandeling of gewrichtsstabilisatie

Artsen vervangen je pees of leiden je pees naar een andere plaats. Deze behandeling wordt meestal uitgevoerd als je pezen niet goed genoeg meer zijn om aan elkaar te hechten.



Peesgreffe

peestransplantatie

Bij een peesgreffe of peestransplantatie vervangt de arts een beschadigde pees met een stukje van een pees uit een ander deel van je lichaam.



Peestransfer bij hamertenen

Artsen verlengen (en verleggen) operatief een pees in je teen. Deze pees brengt je teen weer recht. Deze operatie behandelt hamertenen.



Peritoneale dialyse

buikspoeling

Bij peritoneale dialyse wordt via een katheter in je buik spoelvloeistof in de buikholte gebracht. Peritoneale dialyse gebeurt dagelijks en kan zowel 's nachts als overdag.



Pijnbehandeling sacro-iliacaal gewricht

De pijnarts injecteert een kleine hoeveelheid verdovingsmiddel in je heiligbeengewricht (infiltratie) en behandelt het met radiofrequente stroom (RF-denervatie).



Pijnbehandeling zonder medicijnen

niet-medicamenteuze pijnbehandeling

Er bestaan tal van behandelingen die je pijn kunnen helpen verlichten. Bespreek met je arts wat bij jou veilig is en mogelijk pijnverzachtend.



Pijnmedicatie

pijnmedicijnen, medicamenteuze of farmacologische pijnbehandeling of pijnbestrijding

Pijnmedicijnen kunnen je pijn verlichten of onderdrukken. Het is belangrijk ze juist te



Pijnstilling na operatie

Een goede pijnbehandeling na de operatie draagt ertoe bij dat er zich minder complicaties voordoen, dat je je comfortabeler voelt en dat je sneller herstelt.

gebruiken: in de juiste dosis, juiste combinatie



te verm

PIP-fusie bij hamertenen

Een PIP-fusie is een operatie om hamertenen te behandelen. De arts neemt het hele gewricht in het midden van je teen weg en plaatst een metalen pinnetje of een schroefje.



PIP-plastiek bij hamertenen

PIP-plastiek is een operatie om hamertenen te behandelen. De arts neemt een stuk van het gewricht in het midden van je teen weg en zet je teen weer recht.



Pisiformectomie

operatie polsartrose, verwijdering van het erwtvormig botje

Dit is een operatie om slijtage van het polsgewricht (artrose) te behandelen. De arts haalt het erwtvormig botje in je pols weg. De ingreep helpt tegen de pijn in je pols.



Plaatsing JJ-stent

plaatsing dubbel J-stent, plaatsing ureterstent

Een dubbel-J-stent is een dun slangetje met aan de twee uiteinden een krul. In de twee krullen zitten gaatjes om de afloop van urine van de nier naar de blaas te bevorderen.



Plaatsingsdossier en D-bilan voor ouderen

We brengen je zorgvraag in kaart en vullen het formulier indicatiestelling in. Dat heb je nodig bij een opname in een woonzorgcentrum of om bepaalde terugbetalingen aan te vragen.



Plexusverdooving

plexusanesthesie, plexusblokkade, zenuwverdooving, perifere zenuwblokkade, zenuwblock, zenuwblok

Bij een plexusblokkade verdooft de anesthesist een specifieke zenuw of bundel van zenuwen die naar je hoofd, nek, schouder, arm, hand, heup, been, voet of een deel ervan gaan.



POEM-operatie

heller myotomie, perorale endoscopische myotomie

POEM is een ingreep om achalasie te behandelen. De arts snijdt de onderste kringspier van de slokdarm door, zodat voedsel weer beter van de slokdarm naar de maag kan.



Polsprothese

Bij een polsprothese vervangt de arts je polsgewricht door een kunstversie, bijvoorbeeld omdat het gewricht versleten is. Na de ingreep kan je minder, maar nog voldoende bewegen.



Predialyse

Als uw nierfunctie ernstig verminderd is bekijken we samen de mogelijke opties van nierfunctievervangende therapie. Je krijgt uitgebreide info over alle behandelingsopties.



Preventie voedselallergie bij kinderen

allergiepreventie, voedingsallergie

In de preventiepoli maken we jonge kinderen vertrouwd met bepaalde voedingsstoffen. Zo verkleinen we de kans op een voedselallergie.



Prostaatoperatie via plasbuis

transurethrale resectie prostaat, TUR prostaat, TURP

Bij die ingreep neemt de uroloog het prostaatweefsel weg dat de plasbuis dichtdrukt. Dat gebeurt via een kijkinstrument dat de uroloog inbrengt in de plasbuis.



Prothese

Een prothese is een hulpmiddel dat een lichaamsdeel of een orgaan vervangt.



Prothese van je vingers

Bij een prothese vervangt de arts je vingergewricht door een kunstversie, bijvoorbeeld omdat je vinger onherstelbaar beschadigd is en je niet meer zonder pijn kan bewegen.



Proximale rij carpectomie

PRC-operatie

Tijdens deze operatie verwijderen artsen de eerste rij polsbeentjes uit je pols.



Psychiatrische ondersteuning voor gehospitaliseerde volwassenen

liaisonpsychiatrie

Bij liaisonpsychiatrie schenken we zowel aandacht aan je mentale gezondheid als aan eventuele lichamelijke gezondheidsproblemen.



Psychosezorg voor volwassenen

De Intensieve Psychiatrische Zorg (IPZO) biedt veiligheid en structuur. Naast het klinische herstel (verbeteren van symptomen) schenken we aandacht aan je persoonlijke herstel.



Pyeleoplastie bij volwassenen

pyelumplastiek, behandeling vernauwing tussen nierbekken en urineleider

Tijdens een pyleoplastie neemt de uroloog de vernauwing tussen het nierbekken en de urineleider weg. Daarna wordt de urineleider terug aan het nierbekken vastgemaakt.



Rechterhartskatheterisatie bij pulmonale hypertensie

Rechterhartkatheterisatie is een onderzoek dat wordt uitgevoerd wanneer je aan pulmonale hypertensie lijdt. Via hartkatheterisatie wordt de bloeddruk in je longslagader gemeten.



Reconstructie voorste kruisband

Voorstekruisbandoperatie, operatie gescheurde kruisband, voorste kruisbandreconstructie, VBK

Bij deze operatie krijg je een nieuwe voorste kruisband in je knie, gemaakt uit andere pezen van je lichaam.



Reconstructieve chirurgie

Met deze chirurgie herstellen we een chronische wonde of een lichaamsdeel dat afwezig of vervormd is. Het probleem kan aangeboren zijn of het gevolg van een ongeval of ziekte.



Redo-chirurgie

Aanpassingen van eerder uitgevoerde vermagerings- of maagoperaties.



Reisvaccinatie bij kinderen

Wanneer je op reis gaat, kunnen een aantal extra vaccins nodig zijn. Ook kinderen kunnen gevaccineerd worden. Vraag je kinderarts om meer informatie.



Release fascia plantaris

release fascia plantaris

Met deze operatie behandelen we een overbelaste pees in je voetzool. Als andere behandelingen niet werken, kan de arts de voetzoolpees losmaken om de hielpijn te verlichten.



Resurfacing prothese

Een resurfacing prothese is een prothesetechniek waarbij slechts een deel van het gewricht wordt vervangen. Hierdoor blijft er meer bot behouden dan bij een volledige prothese.



Revalidatie in het ziekenhuis (SP-revalidatie)

SP-revalidatie betekent dat je verblijft in een gespecialiseerd revalidatieziekenhuis of op een ziekenhuisafdeling die specifiek gericht is op revalidatie.



Revalidatie na bloedkanker

sport na een hematologische maligniteit

We hebben een bewegingsprogramma voor patiënten die herstellen van een kwaadaardige bloedziekte. De oefeningen helpen patiënten om zich beter, sterker en minder vermoeid te voelen.



Revisie enkelprothese

Revisiechirurgie is een operatie om je geplaatste enkelprothese te vervangen of te herstellen. Dat kan nodig zijn als de prothese pijn doet, versleten is of loskomt.



Robotchirurgie voor het plaatsen van een prothese

ROSA-robot, RObotic Surgical Assistant, operatierobot, robotgeassisteerde prothese

De ROSA-robot is een navigatiesysteem dat de chirurg helpt bij het plaatsen van een prothese.



Revalidatie na amputatie

Na een amputatie helpt een multidisciplinair team je om zo zelfredzaam mogelijk te worden, om te gaan met het letsel en eventueel te wennen aan je prothese - als je er een hebt.



Revalidatie na een niet aangeboren neurologische aandoening (NAH)

NAH-revalidatie

Een hersenletsel kan plots ontstaan, bijvoorbeeld na een ongeval, beroerte of ziekte. Bij je revalidatie streven we naar herstel en helpen we je om te gaan met de beperkingen.



Revisie heupprothese

Revisiechirurgie is een operatie om je geplaatste heupprothese te vervangen of te herstellen. Dat kan nodig zijn als de prothese pijn doet, versleten is of loskomt.



Rookstop

ZAS organiseert regelmatig rookstopcursussen in groep.



RSV-preventie

RSV-vaccin

Je kan je baby beschermen tegen het RSV-virus met een prik die wordt terugbetaald door de mutualiteit, of door je als moeder te laten vaccineren tijdens de zwangerschap.



Scaphoïdectomie

Bij een scaphoïdectomie verwijdert de arts het os scaphoïdeum. Dat is een van de acht kleine handwortelbeentjes onderaan je hand.



Schildklieroperatie

schildklierchirurgie, thyroïdectomie, wegname schildklier, verwijdering schildklier, schildklierresectie

Een operatie waarbij de arts je schildklier gedeeltelijk of volledig verwijdert. Je schildklier is een orgaan vooraan in je hals en zorgt voor de productie van hormonen in je bloed



Schouderprothese

Als je schoudergewricht onherstelbaar beschadigd is en je pijn hebt bij het bewegen, kan de arts een prothese plaatsen en je schoudergewricht vervangen door een kunstversie.



Rugrevalidatie

behandeling van rugpijn

Rugrevalidatie is een vorm van ondersteuning bij terugkerende rugklachten. We trainen je spieren en leren je over ergonomie. We tonen je ook hoe je met de pijn kan omgaan.



Schaamlipcorrectie

labiaplastie

Bij sommige vrouwen zijn de kleine schaamlippen groter dan de buitenste. Dit kan ongemakken of onzekerheid veroorzaken. We kunnen dit corrigeren, vaak onder lokale verdoving.



Schooloverleg

Schooloverleg betekent dat leerkrachten en zorgverleners samenwerken om te bespreken wat een kind nodig heeft op school.



Schouderrevalidatie

Na een operatie of blessure aan je schouder is het belangrijk om goed herstellen. Tijdens dit traject leren we je om je schouder te ontlasten en nadien weer correct te gebruiken.



Sedatie

Met geneesmiddelen verlagen we je bewustzijn zodanig dat je een operatie of onderzoek niet als onaangenaam ervaart of er zelfs niets van merkt.



Shockwavetherapie

ESWT, shockwave, extracorporeal shockwave therapy, schokgolft therapie

ESWT of shockwavetherapie is een behandeling waarbij we met een apparaatje een schokgolf door een pees sturen. Hierdoor wordt die pees gestimuleerd om zichzelf te herstellen.



Single Anastomosis Duodenal-Ileal bypass (SADI)

De arts combineert een sleeve gastrectomie met een darmomleiding. Hij verwijdert het maagdeel met de hongersensoren en leidt je 12-vingerige darm en een deel van je dunne darm om.



Sinusoperatie

functionele endoscopische sinuschirurgie (FESS)

Bij een sinusoperatie maakt de NKO-arts via je neus de doorgangen van je sinussen (neusbijholten) weer open.



Spalk- of bracetherapie

Spalken en braces zijn hulpmiddelen die je extern draagt om één of meerdere functies van je gewricht te ondersteunen. Er bestaan spalken en braces voor je hand, pols en elleboog.



Spinale verdooving

Spinale ruggenprik, spinale anesthesie, lumbale anesthesie

Met een spinale ruggenprik verdooft de anesthesist de onderste helft van je lichaam.



Spinale-epidurale verdooving

combinatie spinale en epidurale verdooving, gecombineerde spinale-epidurale verdooving, spinale-epidurale anesthesie, gecombineerde spinale-epidurale anesthesie, gecombineerde ruggenprik

De spinale ruggenprik verdooft de onderste helft van je lichaam. Daarna wordt er een katheter (zeer dun buisje) geplaatst voor de toediening van pijnmiddelen.



Sport bij diabetes

Met ons bewegingsprogramma helpen we je als diabetespatiënt een actieve levensstijl aan te nemen én vol te houden. Met beweging houd je je bloedsuikerspiegel beter onder controle.



Sport na obesitaschirurgie

Dit is een bewegingsprogramma dat je kan volgen na een obesitasingreep. We proberen je gewichtsverlies te versnellen en leren je om te sporten op een manier die je kan volhouden.



Starten met medicatie bij IBD

IBD-aandoeningen zoals de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa kan je behandelen met medicatie zodat je minder last hebt van je klachten. Je arts adviseert je hierbij.



Stembandoperatie

microlaryngoscopie

Bij een stembandoperatie neemt de NKO-arts afwijkingen op je stembanden weg, bijvoorbeeld een poliep (goedaardige zwelling) of een cyste (blaasje gevuld met vocht).



Stent in je maag, slokdarm of darm

Een stent is een buisje dat we in je dikke darm, slokdarm of maag plaatsen. Het maakt een te smalle doorgang wat meer open.



Sterilisatie bij mannen

vasectomie

Met een kleine ingreep onderbreekt de uroloog de zaadleiters ter hoogte van de balzak.



Steunzolen

Een steunzool is een inlegzool voor schoenen die is ontworpen om de voet te ondersteunen en de druk gelijkmatig te verdelen. Ze kunnen je houding verbeteren en pijn verlichten.



Stijgbeugeloperatie

stapedotomie, stapeschirurgie

We nemen het bovenste gedeelte van de aangetaste stijgbeugel (1 van de 3 gehoorbeentjes in je oor) weg en plaatsen een prothese die de geluidsgolven doorgeeft aan het binnenoor.



Subtalaire arthrodesese

Dit is een operatie waarbij de arts je hielbeen vastmaakt aan je sprongbeen en zo je onderste spronggewricht vastzet. Dat vermindert de pijn bij artrose in je voet.



Synovectomie

schoonmaken pezen of gewrichten

Een synovectomie is een behandeling waarbij de arts slijmvlies aan de binnenkant van je gewricht of pees gedeeltelijk of volledig verwijdert, bijvoorbeeld omdat het ontstoken is.



Tandimplantaten

Een implantaat is een titanium kunstwortel die je natuurlijke wortel vervangt. De tandarts vervaardigt hierop de bijhorende tand/kroon.



Teentransfer

Een teentransfer is een operatie bij patiënten die een vinger missen. De arts neemt een van de tenen weg en bevestigt die op de plaats van de ontbrekende vinger.



Tenodermodesese

Tenodermodesese is een mogelijke operatie om een malletvinger te behandelen. Tijdens de operatie worden de huid van de vinger en de pees samen gehecht.



Therapeutische hysteroscopie

Kijkoperatie baarmoeder

Bij een therapeutische hysteroscopie kijkt de arts in de baarmoeder met een camera en voert ook meteen een ingreep uit. De camera zit op een buis die we inbrengen via de vagina.



Therapeutische laparoscopie

Kijkoperatie buikholte

Bij een therapeutische laparoscopie brengt de arts een camera en instrumenten in via sneetjes in de buik. Dat is minder ingrijpend dan een openbuikoperatie.



Thuishemodialyse

Soms is thuishemodialyse mogelijk. De patiënt voert zelf, of samen met een mantelzorger, de hemodialyse thuis uit. De Nierkliniek zorgt dan voor een intensieve begeleiding.



Tijdelijke overname

Tijdelijke overname van de ademhaling, nierfunctie en/of andere levensnoodzakelijke functies tot de patiënt opnieuw volledig zelfstandig kan functioneren.



Totale heupprothese

kunstheup

Bij een totale heupprothese vervangt de arts het gewricht in je heup door een kunstversie.



Totale knieprothese

volledige knieprothese, TKP, kunstknie

Bij deze prothese vervangt de arts het volledige kniegewricht door een kunstversie. Dat is anders dan bij een halve knieprothese, die maar een deel van het kniegewricht vervangt.



Traanwegoperatie

dacryocystorhinostomie (DCR)

Bij een verstopping van de traanwegen wordt een nieuwe verbinding gemaakt tussen de traanzak en de neusholte. Zo kunnen de tranen weer via de neus worden afgevoerd.



Transcutane elektrische neurostimulatie

TENS

Via elektroden op je huid stuurt het TENS-toestel elektrische prikkels naar je zenuwen. Het is een niet-ingrijpende methode om (chronische) pijn te verlichten zonder medicatie.



Transforaminale epidurale infiltratie

De pijnarts plaatst na lokale verdoving in je lage rug een fijne naald tot in de epidurale ruimte in je wervelkolom en spuit daar pijnstillende medicatie in.



Transurethrale resectie blaas

TUR blaas, TURB

Een TUR blaas dient om via je plasbuis blaastumoren weg te halen.



Trapezectomie met het ligamentreconstructie

Een trapezectomie is een operatie bij artrose aan de duim. De arts verwijdert het trapeziumbeentje, een van de acht beentjes in je polsgewricht, en herstelt het ligament.



Triple arthrodese

Een triple arthrodese is een operatie waarbij de arts drie gewrichten in je achtervoet vastzet, bijvoorbeeld om artrose in je achtervoet te behandelen.



Trommelvliesbuisjes

plaatsing diabolos

Bij deze operatie plaatsen we een buisje (diabolo) in een sneetje in het trommelvlies zodat er opnieuw lucht in het middenoor kan komen.



Trommevliessluiting

myringoplastie, tympanoplastie

Bij myringoplastie sluiten we een gaatje in je trommelvlies. Bij tympanoplastie controleren we de beweeglijkheid van de gehoorbeentjesketen en verbeteren zo nodig de functie ervan.



UV-therapie bij huidziekten

Ultravioletbestraling of UV-therapie werkt met een lichtcabine waarin je plaatsneemt.



Vaccinatie tegen de griep

griepvaccin, influenzavaccin, griepsput

Kwetsbare mensen en hun naasten kunnen zich tegen de griep beschermen door zich jaarlijks te laten vaccineren tussen oktober en december.



Vaccinatie tegen meningokokken type B

Vaccin tegen meningokokken type B

Aanvullend op het vaccin tegen meningokokken, dat al in het standaard vaccinatieschema zit, bestaat er ook een bijkomend vaccin tegen meningokokken type B.



Vaccinatie tegen windpokken

vaccinatie tegen Varicella

Het vaccin tegen de windpokken behoort momenteel niet tot het standaard vaccinatieschema. Bespreek met je kinderarts of dit aanvullend vaccin nuttig is voor jouw kind.



Vaccinaties bij reuma

Patiënten met reumatische aandoeningen hebben een hoger risico op bepaalde infecties. Die infecties kunnen ook gecompliceerder verlopen door hun ziekte en hun medicatie.



Vakantiedialyse

Te veel tekens Voorstel: Op vakantie in België? Zet je dialyse voort bij ZAS.

Ben je al nierpatiënt binnen ZAS, dan helpen we je graag met je vakantiedialyse.



Verlavingszorg voor volwassenen

We vinden het essentieel om een veilige omgeving te creëren waarin je kan ontwennen maar waar je ook zelf je verantwoordelijkheid en zelfstandigheid opneemt.



Verwijderen van een peescyste

ganglioncyste

Tijdens deze operatie verwijdert de arts een peescyste. Dat is een met vocht gevulde zwelling aan een gewricht, meestal de hand, pols of voet.



Vingeramputatie

Een vingeramputatie is een operatie waarbij de arts je vinger of een deel ervan wegneemt, bijvoorbeeld omdat je vinger onherstelbaar beschadigd is.



Volledige verdoving

Algemene verdoving, algemene anesthesie, algemene narcose

Bij een algemene verdoving wordt je hele lichaam verdoofd. Via een infuus krijg je slaapmiddelen toegediend waardoor je in een kunstmatige slaap valt.



Verwijderen van een mucoïde cyste

Een mucoïde cyste is een kleine, met vocht gevulde zwelling bij de nagelriem van je vinger. Als de zwelling storend is, kan de arts de cyste wegnemen onder lokale verdoving.



Verwijderen van een polscyste

Tijdens deze operatie verwijdert de arts een cyste aan de pols. Een cyste is een met vocht gevulde zwelling. Cysten zijn altijd goedaardig.



Voedingsondersteuning bij ouderen

nutritionele ondersteuning bij ouderen

Bij elke geriatrische patiënt die opgenomen wordt in ons ziekenhuis, doen we standaard een voedingsscreening zodat we indien nodig onmiddellijk ondersteuning kunnen opstarten.



Volledige verdoving bij kinderen

algemene verdoving, algemene anesthesie, algemene narcose bij kinderen

Bij een algemene verdoving wordt het hele lichaam verdoofd. Bij kinderen gebeurt dat meestal met een maskertje waarlangs ze een slaapverwekkend gas inademen.



Volledige verdoving met epidurale verdoving bij kinderen

algemene verdoving, algemene anesthesie, algemene narcose bij kinderen, epidurale ruggenprik, epidurale anesthesie, peridurale analgesie bij kinderen

Soms combineren we een volledige verdoving met een epidurale verdoving. Via een katheter in de ruimte rond het ruggenmerg kunnen we je kind ook na de operatie pijnverdooving geven.



Volledige verdoving plus lokale/locoregionale verdoving bij kinderen

algemene verdoving, algemene anesthesie, algemene narcose bij kinderen

Soms combineren we een volledige verdoving met een locoregionale verdoving. Bij deze gedeeltelijke verdoving maken we een bepaald deel van het lichaam gevoelloos (bijvoorbeeld de armen of benen).



Vrijmaken geknelde elleboogzenuw

release en/of transpositie nervus ulnaris

Deze operatie dient om de druk te verlichten wanneer je last hebt van een geknelde elleboogzenuw. De arts maakt meer plaats voor de zenuw, zodat de klachten afnemen.



Vroegtijdige zorgplanning voor ouderen

Met een geriater, ergotherapeut, psycholoog en sociaal werker kan je over de toekomst van je leven, de zorg die nog je wil en je levenseinde spreken.



Wegname halscyste

sistrunk

Bij deze operatie nemen we een halscyste weg. Dat is een onnatuurlijke holte in de hals die gevuld is met vocht.



Wegname halsfistel

fistulectomie

Bij deze operatie nemen we een halsfistel weg. Dat is een abnormale verbinding tussen de huid en de dieper gelegen structuren in de hals.



Wegname neuspoliepen

adenotomie, verwijdering neusamandelen

Bij deze operatie nemen we de neusamandelen (verdikt lymfklierweefsel) achteraan in de neus weg.



Wegname onderkaakspeekselklier

wegname glandula submandibularis, submandibulaire speekselklierwegname

Wegname van de volledige onderkaakspeekselklier kan nodig zijn bij chronische ontsteking (met steenvorming) of

als er goedaardige of kwaadaardige tumoren aanwezig zijn.



Wegname oorspeekselklier

wegname glandula parotis, parotidectomie

Oppervlakkige of totale wegname van de oorspeekselklier kan nodig zijn bij gezwellen van de oorspeekselklier zoals het pleiomorf adenoom en het adenolymfoom (Warthin-gezwel).



Wegname strottenhoofd

laryngectomie

Bij een laryngectomie nemen we je strottenhoofd (larynx) weg. De reden daarvoor is in de meeste gevallen strottenhoofdkanker (larynxcarcinoom).



Weke delen operatie

Dat zijn weefsels onder je huid die zich o.a. rond je organen, spieren en botten bevinden. De chirurg opereert bij o.a. huidletsels, lipomen, cysten, melanomen en sarcomen.



Wondzorg bij ouderen

Het wondzorgprogramma richt zich tot geriatrische patiënten met moeilijk helende, lang aanslepende of complexe wonden.



Zenuwwortelblokkade

Bij een zenuwwortelblokkade verdooft de pijnarts een zenuwwortel om je pijn te verminderen. Dat kan ter hoogte van je nek, borst of onderrug.



Zuurstoftherapie bij longaandoeningen

Via je neus of mond krijg je extra zuurstof. Daardoor moeten je longen en je hart minder hard werken.

Info ombudsdienst

Heb je een compliment of ben je niet tevreden?

Dat kan je via de website melden aan de Ombudsdienst: [zas.be/ombudsdienst](https://www.zas.be/ombudsdienst)

VU: Willeke Dijkhoffz, Kempenstraat 100, 2030 Antwerpen

Source: <https://www.zas.be/locaties/zas-vincentius>