

Cubital tunnel syndroom

Deze aandoening ontstaat door verhoogde druk op de nervus ulnaris of elleboogzenuw. Het doet pijn en geeft tintelingen of een doof gevoel in je pink en een deel van je ringvinger.

Over

Diensten

1 - 2 van 2

≡ Filters



Dienst

Hand- en polskliniek

handcentrum, centrum voor hand en pols, hand- en polschirurgie

Aanwezig op de volgende locaties:

ZAS Augustinus



Dienst

Orthopedie en Traumatologie

orthopedische en traumatologische heelkunde

Aanwezig op de volgende locaties:

ZAS Augustinus

ZAS Cadix

ZAS Erasmus

ZAS Hoge Beuken

ZAS Medisch Centrum Kaai 142

ZAS Middelheim

ZAS Palfijn

ZAS Sint-Jozef

ZAS Vincentius

ZAS Paola

Info ombudsdienst

Nullam id dolor id nibh ultricies vehicula ut id elit. Vivamus sagittis lacus vel augue laoreet rutrum faucibus dolor auctor. Integer posuere erat a ante venenatis dapibus posuere velit aliquet.

Verantwoordelijke uitgever

Nullam id dolor id nibh ultricies vehicula ut id elit. Vivamus sagittis lacus vel augue laoreet rutrum faucibus dolor auctor. Integer posuere erat a ante venenatis dapibus posuere velit aliquet.

Source: <https://www.zas.be/aandoeningen/cubital-tunnel-syndroom>



Cubital tunnel syndroom