



Operatie van lage anorectale malformatie bij jongens

De anus wordt operatief verplaatst zodat die binnen de kringspier komt. Je kind blijft een paar dagen in het ziekenhuis.

Over

Meestal is bij deze operatie geen stoma nodig, tenzij de arts anders beslist. Als de wond genezen is, moet de anus ongeveer een half jaar dagelijks opgerekt worden om deze soepel te houden. Je leert hoe je dat zelf kan doen.

Zorgverleners


1 - 3 van 3

Filters



Algemene heelkunde | Chirurgie bij kinderen

Dr. Dirk Vervloessem



Algemene heelkunde | Chirurgie bij kinderen

Dr. Stefanie Devriendt

ZAS Middelheim

ZAS Paola

Afspraak

Meer info

ZAS Palfijn

ZAS Paola

Afspraak

Meer info



Algemene heelkunde | Chirurgie bij kinderen |
Obesitascentrum

Dr. Stijn Heyman

ZAS Cadix

ZAS Paola

Afspraak

Meer info

Diensten

1 - 1 van 1

≡ Filters





Dienst

Chirurgie bij kinderen

Aanwezig op de volgende locaties:

ZAS Paola

Contacteer

Over deze dienst

Info ombudsdienst

Nullam id dolor id nibh ultricies vehicula ut id elit. Vivamus sagittis lacus vel augue laoreet rutrum faucibus dolor auctor. Integer posuere erat a ante venenatis dapibus posuere velit aliquet.

Verantwoordelijke uitgever

Nullam id dolor id nibh ultricies vehicula ut id elit. Vivamus sagittis lacus vel augue laoreet rutrum faucibus dolor auctor. Integer posuere erat a ante venenatis dapibus posuere velit aliquet.

Source: <https://www.zas.be/behandelingen/operatie-van-lage-anorectale-malformatie-bij-jongens>

Operatie van lage anorectale malformatie

 **bij jongens**