



Ijzertekort en bloedarmoede bij ouderen

Bij bloedarmoede heb je te weinig rode bloedcellen of werken ze niet goed. Dat kan het gevolg zijn van een tekort aan ijzer in je bloed.

Over

Oorzaken

Bloedarmoede en ijzertekort komen vaak voor bij ouderen. Ze kunnen het gevolg zijn van onder andere hevig bloedverlies, geleidelijk verlies door een discrete bloedsijpeling (onder andere bij chronisch gebruik van bloedverdunners) of te weinig ijzerinname.

Gevolgen

Bloedarmoede en ijzertekort kunnen aanleiding geven tot vermoeidheid, verminderde inspanningsmogelijkheden, acute verwardheid, onstabieleit en valrisico, of hartproblemen.

Meer lezen over de behandeling en opvolging van ijzertekort bij ouderen.

Laatst bijgewerkt op 21/06/2024

Diensten

1 - 1 van 1

Filters



Dienst

Geriatric

Ouderdomsgeneeskunde,
Ouderengeneeskunde

Aanwezig op de volgende locaties:

ZAS Augustinus

ZAS Cadix

ZAS Hoge Beuken

ZAS Middelheim

ZAS Palfijn

ZAS Sint-Jozef

ZAS Vincentius

Info ombudsdienst

Nullam id dolor id nibh ultricies vehicula ut id elit. Vivamus sagittis lacus vel augue laoreet rutrum faucibus dolor auctor. Integer posuere erat a ante venenatis dapibus posuere velit aliquet.

Verantwoordelijke uitgever

Nullam id dolor id nibh ultricies vehicula ut id elit. Vivamus sagittis lacus vel augue laoreet rutrum faucibus dolor auctor. Integer posuere erat a ante venenatis dapibus posuere velit aliquet.

Source: <https://www.zas.be/aandoeningen/ijzertekort-en-bloedarmoede-bij-ouderen>

IJzertekort en bloedarmoede bij ouderen

