



Ondervoeding bij ouderen

Ondervoeding kan gevolgen hebben voor het dagelijks functioneren van ouderen. Het vergroot ook de kans op complicaties bij ziekte en kan het herstel na ziekte langer doen duren.

Over

Ouderen eten vaak minder gevarieerd. Mogelijk eten ze minder dan vroeger, bijvoorbeeld door kauw- en slikproblemen, door opname in het ziekenhuis (geen eetlust, koorts...) of een sombere stemming. Soms vergeten ze ook te eten.

We kunnen de voedingsstatus opnemen met een bevraging of met een bio-impedantie-analyse.

Meer lezen over de opvolging van vermagering en slikproblemen bij ouderen.

Diensten

1 - 1 van 1

≡ Filters



Dienst

Geriatric

Geriatric medicine,
Geriatrics

Present at the following locations:

ZAS Augustinus

ZAS Cadix

ZAS Hoge Beuken

ZAS Middelheim

ZAS Palfijn

ZAS Sint-Jozef

ZAS Vincentius

Info ombudsdienst

Nullam id dolor id nibh ultricies vehicula ut id elit. Vivamus sagittis lacus vel augue laoreet rutrum faucibus dolor auctor. Integer posuere erat a ante venenatis dapibus posuere velit aliquet.

Verantwoordelijke uitgever

Nullam id dolor id nibh ultricies vehicula ut id elit. Vivamus sagittis lacus vel augue laoreet rutrum faucibus dolor auctor. Integer posuere erat a ante venenatis dapibus posuere velit aliquet.

Source: <https://www.zas.be/aandoeningen/ondervoeding-bij-ouderen>



Malnutrition in the elderly