



Behandeling heupdysplasie bij kinderen

Als het heupgewricht van je kindje niet goed ontwikkeld is, kan de arts dat proberen te corrigeren met een spreidbroekje, een gipsbroekje of, als het nodig is, een operatie.

Bij geringe afwijking van heupdysplasie volstaat een speciale spreidbroek. In meer ernstige gevallen is het soms noodzakelijk om de heup onder algemene verdoving in de juiste positie te zetten. Nadien wordt er een gipsbroek aangelegd voor een periode van minimum 2 maanden. Later wordt deze gipsbroek vervangen door een spreidbroek. In uitzonderlijke gevallen moet er uitgebreid geopereerd worden.

De orthopedisch chirurgen van ZAS volgen kinderen met heupdysplasie op tot ze volgroeid zijn.

Laatst bijgewerkt op 03/12/2024

Zorgverleners

1 - 4 van 4



Orthopedie voor kinderen

Dr. Kristof Fabry

ZAS Paola



Orthopedie en Traumatologie | Orthopedie voor kinderen

Dr. Christophe Jans

ZAS Cadix

ZAS Medisch Centrum Kaai 142

+1



Orthopedie en Traumatologie | Orthopedie voor kinderen

Dr. Sandra Prinsen

ZAS Augustinus

ZAS Paola



Orthopedie voor kinderen

Dr. Dirk Puylaert

ZAS Paola

Diensten

1 - 1 van 1



Dienst

Orthopedie voor kinderen

Aanwezig in de volgende locaties:

ZAS Augustinus

ZAS Cadix

ZAS Hoge Beuken

ZAS Medisch Centrum Kaai 142

ZAS Middelheim

ZAS Palfijn

ZAS Paola

ZAS Sint-Jozef

ZAS Vincentius

Contacteer

Over deze dienst

Info ombudsdienst

Heb je een compliment of ben je niet tevreden?

Dat kan je via de website melden aan de Ombudsdienst: zas.be/ombudsdienst

VU: Willeke Dijkhoffz, Kempenstraat 100, 2030 Antwerpen

Source: <https://www.zas.be/behandelingen/behandeling-heupdysplasie-bij-kinderen>