



Behandeling heupdysplasie bij kinderen

Als het heupgewricht van je kindje niet goed ontwikkeld is, kan de arts dat proberen te corrigeren met een spreidbroekje, een gipsbroekje of, als het nodig is, een operatie.

Over

Bij geringe afwijking van heupdysplasie volstaat een speciale spreidbroek. In meer ernstige gevallen is het soms noodzakelijk om de heup onder algemene verdoving in de juiste positie te zetten. Nadien wordt er een gipsbroek aangelegd voor een periode van minimum 2 maanden. Later wordt deze gipsbroek vervangen door een spreidbroek. In uitzonderlijke gevallen moet er uitgebreid geopereerd worden.

De orthopedisch chirurgen van ZAS volgen kinderen met heupdysplasie op tot ze volgroeid zijn.

Zorgverleners

1 - 1 van 1

 Filters



Orthopedie en Traumatologie

Dr. Christophe Jans

ZAS Cadix

ZAS Medisch Centrum Kaai 142

+1


Afspraak

Meer info

Diensten

1 - 1 van 1

Filters



Dienst

Orthopedie en Traumatologie

orthopedische en traumatologische heekunde

Aanwezig op de volgende locaties:

ZAS Augustinus

ZAS Cadix

ZAS Erasmus

ZAS Hoge Beuken

ZAS Medisch Centrum Kaai 142

ZAS Middelheim

ZAS Palfijn

ZAS Sint-Jozef

ZAS Vincentius

ZAS Paola

Contacteer

Over deze dienst

Info ombudsdienst

Nullam id dolor id nibh ultricies vehicula ut id elit. Vivamus sagittis lacus vel augue laoreet rutrum faucibus dolor auctor. Integer posuere erat a ante venenatis dapibus posuere velit aliquet.

Verantwoordelijke uitgever

Nullam id dolor id nibh ultricies vehicula ut id elit. Vivamus sagittis lacus vel augue laoreet rutrum faucibus dolor auctor. Integer posuere erat a ante venenatis dapibus posuere velit aliquet.

Source: <https://www.zas.be/behandelingen/behandeling-heupdysplasie-bij-kinderen>



Behandeling heupdysplasie bij kinderen