



Zweettest bij kinderen

Met een zweettest wordt mucoviscidose ofwel taaislijmziekte nagekeken.

Over

Bij mucoviscidose is de zoutuitscheiding via het zweet veel hoger dan normaal. Ook een aantal andere aandoeningen kunnen een verstoorde zweetproductie geven. De zweettest wordt gedaan bijvoorbeeld bij kinderen met veel luchtwegproblemen en/of een slechte groei.

Vorbereiding

Laat je kind vooraf aan het onderzoek zeker goed drinken en eten en kleeft het kind warm aan. Dit om de hoeveelheid zweet te vergroten.


Verloop

De huid wordt schoongemaakt op 2 plaatsen op arm/been en er worden 2 elektrodes geplaatst. Nadien wordt zweet opgevangen met een opvanghorloge die met een zwachtel om arm of been wordt bevestigd. Hierin zal het zoutgehalte gemeten worden. Dit is niet gevaarlijk voor je kind en heeft geen bijwerkingen.

Nazorg

Nadien wordt de huid nog schoongemaakt en kan je naar huis vertrekken. Het eerste resultaat kan direct bekeken worden door de verpleegkundige en zo nodig met de arts besproken worden. Definitief resultaat volgt later via laboratorium en arts.

Diensten



Dienst

Longziekten bij kinderen

Aanwezig op de volgende locaties:

ZAS Paola

Contacteer

Over deze dienst

Info ombudsdienst

Nullam id dolor id nibh ultricies vehicula ut id elit. Vivamus sagittis lacus vel augue laoreet rutrum faucibus dolor auctor. Integer posuere erat a ante venenatis dapibus posuere velit aliquet.

Verantwoordelijke uitgever

Nullam id dolor id nibh ultricies vehicula ut id elit. Vivamus sagittis lacus vel augue laoreet rutrum faucibus dolor auctor. Integer posuere erat a ante venenatis dapibus posuere velit aliquet.



Zweettest bij kinderen