



Redo-operatie

Een redo-operatie is een aanpassing van een eerder uitgevoerde vermagerings- of maagoperatie.

Over

Op deze pagina

[Wat is een redo-operatie? →](#)

[Wanneer redo-operaties? →](#)

Wat is een redo-operatie?

De arts voert een redo-operatie uit als je al eens aan je maag geopereerd bent, maar niet (meer) tevreden bent met het resultaat of te veel bijverschijnselen hebt. Redo-operaties worden ook redo-chirurgie of heringrepen genoemd.

Voor je een redo-operatie overweegt, raden we je aan om je eet- en leefgewoonten met de diëtist en psycholoog aan te pakken. Wanneer de resultaten daarvan niet succesvol zijn, je BMI opnieuw hoger is dan 35 en je een tweede operatie overweegt, zal je opnieuw de preoperatieve onderzoeken moeten ondergaan. Deze resultaten worden besproken op het multidisciplinair overleg.

Wanneer redo-operaties?

- **Na een maagband.** Ongunstige resultaten na een maagband kunnen soms met een tweede operatie worden opgelost. Via één kijkoperatie kan de arts een maagband verwijderen en/of vervangen door een gastric bypass.

Symptomen waarbij een redo-operatie aangewezen is:

- Je verloor te veel of te weinig gewicht.
 - Je moet regelmatig braken.
 - De maagband is verschoven ('slipping').
- **Na een vroegere 'Mason'**, waarbij je maag deels werd dichtgeniet en je een maagband kreeg. Via een kijkoperatie vormt de arts de vroegere ingreep om tot een gastric bypass.

Symptomen/klachten waarbij een redo-operatie aangewezen is:

- Je bent weer veel aangekomen.
 - Je hebt veel last van braken.
 - Je hebt last van brandend maagzuur/reflux.
- **Na een scopinaro**, een ingreep die veel werd uitgevoerd in de jaren '80 en '90. Ongunstige resultaten na een darmomleiding volgens scopinaro kan de arts oplossen door die operatie om te vormen tot een gastric bypass. Het is ook mogelijk om na een scopinaro een deel van de maag te verwijderen.

Symptomen/klachten waarbij een redo-operatie aangewezen is:

- Winderigheid
 - Diarree
 - Vitaminetekort
 - Ijzertekort
- **Na een sleeve gastrectomie.** De operatie is soms de eerste stap om veel gewicht te verliezen. Na de eerste gewichtsval kan je voor een nieuwe ingreep kiezen, zoals voor een omvorming naar een gastric bypass of duodenal switch.
 - **Na een gastric bypass.** Het is mogelijk dat je na verloop van tijd weer veel kan eten na een gastric bypass operatie, waardoor je weer aankomt. In dat geval kan de arts je maag of je maaguitgang terug verkleinen (via

laparoscopie of endoscopie) en/of eventueel een ring rond je maag plaatsen (banded bypass).

Zorgverleners

1 - 8 van 8

≡ Filters



Algemene heelkunde | Obesitascentrum

Dr. Bart Gypen

ZAS Cadix

Afspraak

Meer info



Algemene heelkunde | Obesitascentrum

Dr. Frank Van Sprundel

ZAS Cadix

Afspraak

Meer info



Endocrinologie | Obesitascentrum

Dr. Ilke Marien



Algemene heelkunde | Obesitascentrum

Dr. Jody Valk

ZAS Cadix

ZAS Elisabeth

Afspraak

Meer info

ZAS Cadix

Afspraak

Meer info



Endocrinologie | Obesitascentrum

Dr. Ludo De Keyser

ZAS Cadix

ZAS Elisabeth

+1

Afspraak

Meer info



Algemene heelkunde | Obesitascentrum

Dr. Magali Blockhuys

ZAS Cadix

Afspraak

Meer info



Algemene heelkunde | Chirurgie bij kinderen |
Obesitascentrum

Dr. Stijn Heyman



Endocrinologie | Obesitascentrum

Dr. Tania Daems

ZAS Cadix

ZAS Erasmus

+1

ZAS Cadix

ZAS Paola

Afspraak

Meer info

Afspraak

Meer info

1 - 1 van 1

Filters



Expertisecentrum

Obesitascentrum

obesitas
overgewicht
zwaarlijvigheid

Aanwezig op de volgende locaties:

ZAS Cadix

Contacteer

Over deze dienst

Info ombudsdienst

Nullam id dolor id nibh ultricies vehicula ut id elit. Vivamus sagittis lacus vel augue laoreet rutrum faucibus dolor auctor. Integer posuere erat a ante venenatis dapibus posuere velit aliquet.

Verantwoordelijke uitgever

Nullam id dolor id nibh ultricies vehicula ut id elit. Vivamus sagittis lacus vel augue laoreet rutrum faucibus dolor auctor. Integer posuere erat a ante venenatis dapibus posuere velit aliquet.

Source: <https://www.zas.be/behandelingen/redo-operatie>



Redo-operatie