



Polymyalgia rheumatica (PMR)

Polymyalgia rheumatica is een ontsteking die spierpijn en stijfheid veroorzaakt, vooral in de schouders, bovenarmen, heupen en bovenbenen, vaak bij oudere volwassenen.



Over

Polymyalgia rheumatica manifesteert zich gemiddeld rond de leeftijd van 70 jaar en komt zelden of nooit voor bij mensen jonger dan 55 jaar. PMR-patiënten kampen met pijn en stramheid in de spieren rond de romp, zoals de spieren van de schouders, bovenarmen, heupen en bovenbenen. Dat bemoeilijkt bepaalde handelingen, zoals rechtekomen uit een zetel of haar kammen. 's Ochtends zijn de klachten vaak meer uitgesproken. Veel patiënten ervaren ook een algemeen ziektegevoel of maken koorts. Soms gaat PMR gepaard met arteritis temporalis: een bloedvatontsteking die onder andere hoofdpijn, een verminderd zicht en pijn bij het kauwen kan geven. PMR-patiënten moeten langdurig corticoiden nemen. Die behandeling slaat heel snel aan en geeft spectaculaire resultaten. We bouwen de dosis traag af in functie van de symptomen en de bloedresultaten.

Diensten

1 - 2 van 2

 Filters





Dienst

Reumatologie

Aanwezig op de volgende locaties:

ZAS Hoge Beuken

ZAS Augustinus

ZAS Cadix

ZAS Middelheim

ZAS Palfijn

ZAS Sint-Jozef

ZAS Vincentius



Dienst

Reumatologie voor kinderen

Aanwezig op de volgende locaties:

ZAS Paola

t. Vivamus sagittis lacus vel augue laoreet rutrum faucibus dolor auctor. Integer posuere erat a ante venenatis dapibus posuere velit aliquet.

Verantwoordelijke uitgever

Nullam id dolor id nibh ultricies vehicula ut id elit. Vivamus sagittis lacus vel augue laoreet rutrum faucibus dolor auctor. Integer posuere erat a ante venenatis dapibus posuere velit aliquet.

Source: <https://www.zas.be/aandoeningen/polymyalgia-rheumatica-pmr>



Polymyalgia rheumatica (PMR)