



Hypersensitiviteitspneumonitis

Bij deze aandoening ontstaat een overgevoelighedsreactie door blootstelling aan medicatie of door het inademen van bepaalde stoffen.


De overgevoelighedsreactie kan ontstaan op medicatie of op allerlei fijne partikels die je inademt. Je immuunsysteem gaat om een onbekende reden overreageren en geeft aanleiding tot een ontstekingsreactie in je longen.

- Bij de **acute vorm** van hypersensitiviteitspneumonitis verdwijnen de klachten 12 tot 24 uur nadat je de blootstelling stopt.
- De **chronische vorm** kan leiden tot blijvende schade aan je longen. Voorbeelden zijn bakkerslong, boerenlong, brouwerslong, champignonkwekerslong, duivenmelkerslong en vogelhouderslong. Vaak is een behandeling met immuunonderdrukkende medicatie nodig.

Hypersensitiviteitspneumonitis is een interstitiële longziekte. Voor de behandeling van interstitiële longziekten werkt de dienst Longziekten nauw samen met Medische beeldvorming, Pathologische anatomie en Reumatologie. Dat gebeurt via het multidisciplinair interstitieel longlijden overleg (MILO).

Diensten

1 - 1 van 1



Dienst

Longziekten

Pneumologie

Info ombudsdienst

Heb je een compliment of ben je niet tevreden?

Dat kan je via de website melden aan de Ombudsdienst: [zas.be/ombudsdienst](https://www.zas.be/ombudsdienst)

VU: Willeke Dijkhoffz, Kempenstraat 100, 2030 Antwerpen

Source: <https://www.zas.be/aandoeningen/hypersensitiviteitspneumonitis>