



Hypersensitiviteitspneumonitis

Bij deze aandoening ontstaat een overgevoelighedsreactie door blootstelling aan medicatie of door het inademen van bepaalde stoffen.

Over

De overgevoelighedsreactie kan ontstaan op medicatie of op allerlei fijne partikels die je inademt. Je immuunsysteem gaat om een onbekende reden overreageren en geeft aanleiding tot een ontstekingsreactie in je longen.


- Bij de **acute vorm** van hypersensitiviteitspneumonitis verdwijnen de klachten 12 tot 24 uur nadat je de blootstelling stopt.
- De **chronische vorm** kan leiden tot blijvende schade aan je longen. Voorbeelden zijn bakkerslong, boerenlong, brouwerslong, champignonkwekerslong, duivenmelkerslong en vogelhouderslong. Vaak is een behandeling met immuunonderdrukkende medicatie nodig.

Hypersensitiviteitspneumonitis is een interstitiële longziekte. Voor de behandeling van interstitiële longziekten werkt de dienst Longziekten nauw samen met Medische beeldvorming, Pathologische anatomie en Reumatologie. Dat gebeurt via het multidisciplinair interstitieel longlijden overleg (MILO).

Diensten

1 - 1 van 1

≡ Filters



Dienst

Longziekten

Pneumologie

Aanwezig op de volgende locaties:

ZAS Augustinus

ZAS Cadix

ZAS Erasmus

ZAS Polikliniek Hof ter Schelde

ZAS Hoge Beuken

ZAS Middelheim

ZAS Palfijn

ZAS Polikliniek Regatta

ZAS Sint-Jozef

ZAS Vincentius

Info ombudsdiens

Nullam id dolor id nibh ultricies vehicula ut id elit. Vivamus sagittis lacus vel augue laoreet rutrum faucibus dolor auctor. Integer posuere erat a ante venenatis dapibus posuere velit aliquet.

Verantwoordelijke uitgever

Nullam id dolor id nibh ultricies vehicula ut id elit. Vivamus sagittis lacus vel augue laoreet rutrum faucibus dolor auctor. Integer posuere erat a ante venenatis dapibus posuere velit aliquet.

Source: <https://www.zas.be/aandoeningen/hypersensitiviteitspneumonitis>



Hypersensitiviteitspneumonitis