



Hormoonremming bij kinderen en jongeren

Puberteitsremmers onderdrukken de productie van geslachtshormonen. Ze remmen lichamelijke veranderingen die gelinkt zijn aan het geboortegeslacht.

Puberteitsremmers worden vaak gebruikt bij jongeren met genderdysforie om ongewenste lichamelijke veranderingen, zoals borstontwikkeling, stemverandering of lichaamsbehaaring, te voorkomen.

Het starten van puberteitsremmers gebeurt meestal bij het begin van de puberteit, wanneer de eerste lichamelijke veranderingen zichtbaar worden. Het gebruik van puberteitsremmers kan helpen om die veranderingen te stoppen, zodat jongeren de tijd krijgen om zorgvuldig hun volgende stappen te overwegen.

De opstart van deze behandeling vindt plaats na meerdere psychologische gesprekken en als ook verdere opvolging mogelijk is.

Puberteitsremmers worden meestal via injectie toegediend, ongeveer elke 12 weken.

De behandeling is omkeerbaar en kan op elk moment gestopt worden.


Lees ook

- [Hormoonremming bij volwassenen](#)
- [Genderbevestigende hormoontherapie](#)

Laatst bijgewerkt op 03/12/2024

Diensten

1 - 1 van 1





Expertisecentrum

Centrum voor genderzorg Antwerpen

CGA
transgenderzorg
gendercentrum
genderzorg
gendertransitiezorg

Aanwezig in de volgende locaties:

ZAS Cadix

Contacteer

Over deze dienst

Heb je een commentaar of ben je niet tevreden:

Dat kan je via de website melden aan de Ombudsdienst: zas.be/ombudsdienst

VU: Willeke Dijkhoffz, Kempenstraat 100, 2030 Antwerpen

Source: <https://www.zas.be/behandelingen/hormoonremming-bij-kinderen-en-jongeren>