



Correctie afhankelijk bovenooglid

Tijdens een ptosiscorrectie verbetert de oogarts de spier die verantwoordelijk is voor het openen van je bovenste ooglid, waardoor het ooglid minder over het oog zakt.

Op deze pagina

1. Waarom een ptosiscorrectie?
2. Waar gebeurt een ptosiscorrectie?
3. Voorbereiding op een ptosiscorrectie
4. Aandachtspunten dag van de ingreep
5. Hoe verloopt een ptosiscorrectie?
6. Aandachtspunten na een ptosiscorrectie (nazorg)
7. Mogelijke complicaties na een ptosiscorrectie
8. Terugbetaling ptosiscorrectie

Waarom een ptosiscorrectie?

We spreken van ptosis als de spier die verantwoordelijk is voor het openen van je bovenste ooglid (levatorspier) niet goed werkt en het daardoor gaat hangen. Bij volwassenen gebeurt dat meestal doordat de spieraanhechting in het ooglid losraakt of het pezige deel van de spier uitrekt.

Er kunnen ook andere oorzaken zijn zoals het langdurig dragen van harde contactlenzen, eerdere oogoperaties, ernstige oogontstekingen, spierziekten of een trauma (ongeval). Ptosis kan je zicht verminderen en vooral je gezichtsveld beperken. Een ptosiscorrectie kan dat probleem oplossen.

Waar gebeurt een ptosiscorrectie?

Een ptosiscorrectie gebeurt altijd ambulantly. Je hoeft dus niet in het ziekenhuis te overnachten, het gaat om een dagopname. De operatie vindt plaats in het chirurgisch dagziekenhuis in ZAS Augustinus of ZAS Cadix.

Vorbereiding op een ptosiscorrectie

- Tijdens de consultatie legt je oogarts uit hoe de operatie zal verlopen en welke verdoving je zal krijgen.
- Een ptosiscorrectie gebeurt meestal onder plaatselijke verdoving met enkele injecties in je ooglid.
- Soms gebeurt de ingreep onder sedatie of volledige verdoving onder toezicht van een anesthesist. In dat geval vragen we je om de vragenlijst voor de preoperatieve voorbereiding in te vullen of krijg je een uitnodiging voor een gesprek met een van onze anesthesisten. Ben je 65 jaar of ouder? Dan zijn er voor je operatie standaard twee onderzoeken nodig: een bloedonderzoek en een ECG.
- Neem je bloedverdunners? Je arts geeft aan vanaf wanneer je tijdelijk moet stoppen met die in te nemen.

Aandachtspunten dag van de ingreep

- Bij een plaatselijke verdoving mag je thuis nog eten en je medicatie innemen.
- Bij een volledige verdoving mag je tot 6 uur voor de ingreep niet meer eten, drinken of roken.
- Gebruik op de dag van de ingreep geen make-up of nagellak.
- Draag losse bovenkleding. Vaak vragen we om die te wisselen voor een operatieschortje.
- Als je zenuwachtig bent voor de ingreep, vraag je als je aankomt in het dagziekenhuis het best een kalmerend pilletje. Daar kan je wat slaperig van worden.
- Omdat je na de ingreep niet zelf met de auto mag rijden, raden we je aan om samen met een begeleider of met het openbaar vervoer naar het dagziekenhuis te komen. Je kan eventueel ook een beroep doen op patiëntenvervoer.

Hoe verloopt een ptosiscorrectie?

- Een ptosiscorrectie duurt gemiddeld 30 minuten per ooglid.
- Tijdens de ingreep moet je je ogen meestal gesloten houden. Door de plaatselijke verdoving voel je geen pijn. Het kan wel zijn dat je af en toe voelt hoe de oogchirurg je gezicht aanraakt.
- Op het einde van de ingreep plakken we de wonde af met een fijne pleister of brengen we zalf aan. Je krijgt een ijsverband om je oogleden te koelen.
- Als je naar huis gaat, krijg je de nodige medicatie of een voorschrift mee voor de nazorg.
- We geven je ook een afspraak om na 7 tot 10 dagen de hechtingen te laten weghalen.

Aandachtspunten na een ptosiscorrectie (nazorg)

- Na de operatie kan het zijn dat je oogleden opzwellen of verkleuren. Om dat zo veel mogelijk te beperken, raden we je aan om de eerste 3 dagen na de operatie regelmatig je oogleden te koelen met ijs. Bij de meeste mensen verdwijnt de zwelling na ongeveer 2 weken, soms duurt het iets langer.
- Kleed je de eerste dag en nacht iets frisser.
- Vermijd warme of alcoholische dranken.
- Breng zalf of druppels aan op de wonde of in het oog zoals voorgeschreven.
- Slaap hoger met je hoofd: gebruik de eerste week na de ingreep een extra kussen.
- Je mag douchen, maar zorg ervoor dat de wonde droog blijft totdat de pleisters zijn weggehaald als die zijn aangebracht.
- Na ongeveer een week worden de hechtingen weggehaald. In het begin zullen de littekens nog zichtbaar zijn, maar die vervagen na een tijdje.
- De eerste 2 weken na de ingreep mag je geen zware inspanningen doen. Ook sporten en zwemmen raden we af.
- Na 2 weken mag je weer make-up gebruiken en het litteken lichtjes masseren om het soepel te houden.
- Bescherm het litteken gedurende 6 maanden tegen de zon met een zonnebril of zonnecrème factor 50.

Mogelijke complicaties na een ptosiscorrectie

Een ptosiscorrectie is over het algemeen een heel veilige ingreep. Complicaties zijn gelukkig zeldzaam.

- De wondjes kunnen wat nabloeden. Als dat gebeurt, ga je het best rechtop zitten en blijf je 15 minuten zonder onderbreking op de wonde drukken met een proper doekje of ijs. Als het nodig is, kan je dat enkele keren herhalen. Kleed je niet te warm.
- Zoals bij elke chirurgische ingreep bestaat er een risico op een ontsteking maar bij ptosiscorrecties komt dat zelden voor.
- Door de zwelling na de operatie, kan je last hebben van een zanderig gevoel in de ogen. Je kan oogdruppels gebruiken om de ogen vochtig te houden.
- In zeldzame gevallen kan er tijdens het herstel verdikt littekenweefsel ontstaan.

! Wanneer contact opnemen?

Bij hevige pijn, forse nabloeding, extreme zwelling, etterige wonde of wazig zicht neem je op weekdays tussen 9 en 17 uur het best contact op met de dienst Oogheelkunde. Op andere momenten ga je het best naar de dienst Spoed.

Terugbetaling ptosiscorrectie

Het ziekenfonds betaalt een ptosiscorrectie alleen terug als het gezichtsveld voldoende beperkt is door het afhangende ooglid. Je oogarts documenteert dat met de nodige foto's. Je oogarts zal de mogelijke terugbetaling met jou bespreken.

Laatst bijgewerkt op 26/12/2024

Zorgverleners

1 - 23 van 23



Oogheelkunde

Dr. Liselotte Aerts

ZAS Augustinus



Oogheelkunde

Dr. Mohammed Al-Saddi

ZAS Cadix

ZAS Hoge Beuken

+1



Oogheelkunde

Dr. Sofie Caen

ZAS Cadix

ZAS Middelheim



Oogheelkunde

Dr. Gregory Carbonez

ZAS Cadix



Oogheelkunde



Oogheelkunde

Dr. Carl Claes



Oogheelkunde

Prof. dr. Veva De Groot

ZAS Cadix

ZAS Middelheim

Dr. Ine Cosemans



Oogheelkunde

Dr. Elise Declerck

ZAS Cadix

ZAS Middelheim



Oogheelkunde

Dr. Jozef Depla

ZAS Cadix



Oogheelkunde

Dr. Eric Feron

ZAS Cadix



Oogheelkunde

Dr. Gregory Haverbeke

ZAS Augustinus



Oogheelkunde

Dr. Liesbet Heremans

ZAS Cadix



Oogheelkunde

Dr. Pieter Nelis

ZAS Cadix

ZAS Palfijn



Oogheelkunde

Dr. Laurence Pierrache

ZAS Cadix

ZAS Middelheim



Oogheelkunde

Dr. Joachim Riems

ZAS Augustinus



Oogheelkunde

Dr. Pieter-Paul Schauwvlieghe

ZAS Cadix



Oogheelkunde

Dr. Lise Sels

ZAS Cadix



Oogheelkunde

Dr. Arnout Vael

ZAS Augustinus



Oogheelkunde

Dr. Jonas Van Den Heurck

ZAS Augustinus



Oogheelkunde

Dr. Nathalie Van Der Hauwaert

ZAS Augustinus



Oogheelkunde

Dr. Veerle Van Severen

ZAS Cadix

ZAS Middelheim



Oogheelkunde

Dr. Marc Veckeneer

ZAS Cadix

ZAS Middelheim



Oogheelkunde

Dr. Philippe Zeyen

ZAS Cadix

ZAS Middelheim

Diensten

1 - 1 van 1



Dienst

Oogheelkunde

Oftalmologie

Aanwezig in de volgende locaties:

ZAS Augustinus

ZAS Cadix

ZAS Hoge Beuken

ZAS Middelheim

ZAS Palfijn

ZAS Paola

ZAS Sint-Jozef

ZAS Vincentius

Contacteer

Over deze dienst

Info ombudsdienst

Heb je een compliment of ben je niet tevreden?

Dat kan je via de website melden aan de Ombudsdienst: [zas.be/ombudsdienst](https://www.zas.be/ombudsdienst)

VU: Willeke Dijkhoffz, Kempenstraat 100, 2030 Antwerpen

Source: <https://www.zas.be/behandelingen/correctie-afhangend-bovenoglid>