



Embolisatie goedaardige prostaatvergroting

Via een klein gaatje in een bloedvat in de lies wordt de bloedtoevoer naar de prostaat gestopt. Daardoor wordt de prostaat week, kleiner en verminderen of verdwijnen de symptomen.

Op deze pagina

1. Waarom een embolisatie bij een goedaardige prostaatvergroting?
2. Voorbereiding op de embolisatie
3. Verloop embolisatie goedaardige prostaatvergroting
4. Aandachtspunten na de embolisatie (nazorg)
5. Mogelijke risico's en complicaties

Waarom een embolisatie bij een goedaardige prostaatvergroting?

Bij mannen met een goedaardige vergroting van de prostaat biedt de ingreep een goed alternatief naast andere behandelingen, zoals een behandeling met medicijnen of een prostaatoperatie via de plasbuis (TUR prostaat).

Vorbereiding op de embolisatie

- Je arts beoordeelt eerst grondig je medische geschiedenis en huidige gezondheidstoestand.
- Om je prostaat in beeld te brengen, kunnen een MRI of een echografie nodig zijn.
- Je krijgt uitleg over de ingreep en de mogelijke risico's.
- Neem je medicijnen? Zeg dat dan zeker aan je arts.

Verloop embolisatie goedaardige prostaatvergroting

- Je krijgt een **blaassonde** om je blaas leeg te maken tijdens de ingreep.
- Een embolisatie gebeurt onder lokale verdoving. Soms wordt die gecombineerd met **sedatie**, zodat je ontspannen bent en geen pijn hebt.
- Om toegang te krijgen tot de bloedvaten, maakt de arts een klein gaatje in een bloedvat, meestal in de lies. Via dat bloedvat brengt de arts een katheter (dunne slang) in en leidt die met behulp van beeldvormingstechnieken (zoals **röntgenfoto's**) naar de bloedvaten die de prostaat van bloed voorzien.
- Vervolgens brengt de arts via de katheter een emboliamateriaal (kleine bolletjes) in de bloedvaten van de prostaat in om de bloedtoevoer af te sluiten. Daardoor krijgt de prostaat minder bloed en wordt die week en kleiner.
- Na de ingreep word je teruggebracht naar de afdeling, waar de verpleegkundigen eventuele pijn en misselijkheid opvolgen.
- Meestal blijf je enkele uren in het ziekenhuis tot je goed hersteld bent. De meeste patiënten kunnen dezelfde dag nog naar huis.

Mogelijke ongemakken na de embolisatie

Het is normaal om wat **ongemak of een drukkend gevoel in de onderbuik** te ervaren.

De eerste dagen na de ingreep kan je ook last hebben van **lichte bloedingen of plasproblemen** (zoals moeite met plassen of vaker moeten plassen), maar dat verdwijnt meestal snel.

Aandachtspunten na de embolisatie (nazorg)

- Na de ingreep is het belangrijk om **voldoende rust** te nemen en zware lichamelijke activiteit te vermijden.
- Mogelijk kan je de dag na de ingreep weer je normale activiteiten hervatten, maar het is belangrijk om de eerste weken **geen zware lichamelijke inspanningen** te doen.
- Je krijgt mogelijk **medicijnen** voorgeschreven om pijn te verlichten of om het urineren te vergemakkelijken.
- Regelmatige **controleafspraken** zijn belangrijk om je herstel op te volgen.

⚠ Wanneer contact opnemen?

Neem contact op met je behandelend arts of ga naar de [dienst Spoed](#) bij

- ernstige pijn
- koorts
- een hevige bloeding
- andere ongewone symptomen
- problemen met plassen die niet verbeteren of verergeren

Mogelijke risico's en complicaties

Zoals bij elke medische ingreep, kunnen er risico's optreden. Dat zijn onder andere:

- infectie op de plaats waar de opening is gemaakt om de katheter in te brengen
- bloeding of hematomen (blauwe plekken) op die plaats
- schade aan omliggende weefsels of bloedvaten, hoewel dat zeldzaam is

Je arts zal de ingreep zorgvuldig uitvoeren om die risico's zo klein mogelijk te houden.

Laatst bijgewerkt op 26/02/2025

ℹ Vragen?

Zorgverleners

Heb je vragen over de embolisatie? Aarzel dan niet om contact op te nemen met je behandelend arts. Die kan je gedetailleerde informatie geven over de ingreep en je herstel.

1 - 2 van 2



Interventionele radiologie | Medische beeldvorming

Dr. Olivier d'Archambeau

ZAS Augustinus

ZAS Sint-Jozef

+1



Interventionele radiologie | Medische beeldvorming

Dr. Maarten Niekel

ZAS Middelheim

Diensten





Dienst

Interventionele radiologie

Aanwezig in de volgende locaties:

ZAS Augustinus ZAS Middelheim

Contacteer Over deze dienst

Info ombudsdienst

Heb je een compliment of ben je niet tevreden?

Dat kan je via de website melden aan de Ombudsdienst: [zas.be/ombudsdienst](https://www.zas.be/ombudsdienst)

VU: Willeke Dijkhoffz, Kempenstraat 100, 2030 Antwerpen

Source: <https://www.zas.be/behandelingen/embolisatie-goedaardige-prostaatvergroting>